


Agrokoncernas pataria

2026 03 24



PASĖLIŲ BŪKLĖ IR ARTIMIAUSI DARBAI

2026 03 24

Meteorologinės sąlygos

Kovo mėnesio antroje pusėje vyrauja sausi ir saulėti orai. Daugelyje Lietuvos rajonų lietaus visai nebuvo, o iškritęs kritulių kiekis tesudarė iki 1,5 mm. Vidutinė oro temperatūra siekia tik apie 5 °C, o įdienesius oro temperatūra pakyla virš 12 laipsnių. Sulaukėme šalų dirvos paviršiuje (nuo 0 iki -2 laipsnių šalčio ir daugiau). Dirvos temperatūra mažai skiriasi nuo vidutinės oro temperatūros. Dirvos drėgmė 10 ir 20 cm gylyje svyruoja nuo 15,7 iki 47,9 proc., gilesniuose dirvos sluoksniuose - nuo 13,6 iki 45,6 proc. ribose.

Šalies zonos	Vidutinė dirvos temperatūra, °C			Vidutinė dirvos drėgmė, proc.		
	10 cm	20 cm	50 cm	10 cm	20 cm	50 cm
Šiaurės	1,8-3,4	2,7-3,7	1,8-3,9	19,3-46,8	22,8-43,6	23,9-42,2
Pietų	2,5-8,2	1,9-8,1	1,2-5,1	17,1-44,7	18,1-43,1	15,7-45,1
Vakarų	1,8-4,9	1,7-4,2	1,8-4,7	19,5-47,9	20,3-46,7	22,9-45,6
Rytų	1,0-5,0	0,7-4,9	0,5-4,3	22,2-44,0	21,4-37,9	19,4-38,4
Vidurio	1,2-5,7	0,7-4,6	0,6-5,0	15,7-43,4	17,4-44,6	13,6-44,9

Pastaba: meteorologiniai duomenys pateikti 13-14 valandos laikotarpiu

2025 metų rudenį vyravę orai sudarė geras sąlygas augalams augti, vystytis ir tinkamai pasiruošti žiemai. Nuo vėlyvo rudens žiemos periodas turėjo kontrastingas oro sąlygas. Nuo sausio mėnesio pradžios susidariusi stora sniego danga ir besilaikantis stiprus šaltis tęsėsi iki pat vasario antros pusės. Susidaręs įšalas skirtinguose šalies rajonuose siekė nuo 3 iki 38 cm. Nuo kalendorinio pavasario pradžios dėl gana neįprastai šiltų orų, sniegas sparčiai tirpo grasindamas ilgalaikiais laukų užmirkimais. Šiuo metu dar yra laukų, kuriuose telkšo nemaži vandens plotai.

Pietinėje šalies dalyje žieminiai augalai jau priauginę naujų baltų šaknelių, kurios apsitraukusios dirvožemiu, pradėjusios savintis mineralines medžiagas. Vidurio Lietuvoje augalai dar tik leidžia naujas šakneles, o šiaurinėje šalies dalyje fiksuojamos pavienės baltos šaknelės požeminėse augalų dalyse.

Apibendrinant galima teigti, kad žieminių javų ir rapsų pasėliai peržiemojo gerai. Vertinant pasėlius pagal pasirinktą žemės dirbimo būdą, sėjomainą, veislės pasirinkimą ar sėjos laiką, situacija skiriasi. Žieminių javų pasėliuose, ant senų augalų lapų, matomas didelis kiekis septoriozės, taip pat yra miltligės, kviečių dryžligės užkrato. Taip pat fiksuojami nedideli pavasarinio pelėsio pažeidimai ant žieminių javų augalų. Grybinių ligų infekcija esanti ant senų augalų lapų gali greitai pereiti ant naujai išaugusių augalų lapų vyraujant palankioms oro sąlygoms.

Nemažai žieminių rapsų laukų, kurie buvo pasėti labai anksti, iš rudens išsiskyrė labai intensyviu savo augimu. Tokiuose laukuose augalų šaknų centras yra parudavęs ir įtrūkęs, augalai labiau pažeisti kopūstinio šakninio paslėptastraublio. Ant likusių senų lapų išlikę fomozės ir kitų grybinių ligų pažeidimai. Taip pat žieminių rapsų augaluose randama pilkojo puvinio pažeidimų. Deja, tokiems augalams padėti jau negalime, jie pasmerkti žūti.

Vertinant žieminių javų augalų būklę po žiemojimo, iš karto galima matyti šių augalų gyvybingumą, tačiau su žieminių rapsų augalais situacija yra šiek tiek sudėtingesnė. Vertindami žieminių rapsų augalus turime kruopščiai apžiūrėti tiek antžeminę, tiek požeminę dalis. Iš pirmo žvilgsnio žali ir

gyvybingai atrodantys augalai gali per kelias dienas sunykti ir ypač saulėtomis dienomis. Priežastis yra augalų šaknys, kurios būna rusvos spalvos ir minkštos, tarsi „guminės“. Augalų gyvybingumui kenkia ant dirvos paviršiaus ilgiau besilaikantis vanduo. Žieminių rapsų augalai yra peržiemoję, kai augalo centre matomi besiformuojantys nauji lapai, o augalų šaknys stiprios, baltos su mažais įtrūkimais.

Kopūstiniai stiebiniai ir kitų rūšių paslėptastraubliai jau prabudę ir pakilę iš žiemojimo vietų. Šią situaciją lėmė kelios kovo mėnesio dienos, kuomet oro temperatūra buvo pakilusi 10-12 °C. Šių kenkėjų suaugėlių plitimas, maitinimasis ir ruošimasis daugintis vyksta jau dabar. Geltonosios vandens gaudyklės – bene geriausias indikatorius, parodantis šių kenkėjų plitimo ir migracijos aktyvumo situaciją kiekviename lauke. Ne tik gaudyklės, bet ir pačius augalus reikia nuolat stebėti. Ypatingai reikia atkreipti dėmesį į laukus, esančius šalia miškingų vietų. Laukų pakraščiuose kenkėjų kiekis būna didžiausias. Šiltomis, saulėtomis dienomis ar vyraujant nedideliam šiltam vėjui visuomet fiksuosime didesnį šių kenkėjų plitimą ir migracijos aktyvumą.

Rekomenduojame stebėti žieminių javų ir rapsų pasėlius, tinkamai įvertinti situaciją ir laiku panaudoti sprendimus atsižvelgiant į augalų auginimo technologiją.

Žieminiai kviečiai

Dauguma pasėlių BBCH 23–27 augimo tarpsnyje.

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Sėkmingam augalų augimui ir vystymuisi reikalingas subalansuotas mineralinių medžiagų kiekis, o tai galima padaryti atliekant pirmą pagrindinį tręšimą biriomis azoto trąšomis.

Piktžolės ne tik dygsta, bet ir auga daug greičiau nei lauko augalai, todėl būtina piktžolių kontrolė. Ypač tuose laukuose, kuriuose rudenį nebuvo taikyti piktžolių kontrolės sprendimai.

Rekomendacija

Azotiniam tręšimui rekomenduojame naudoti trąšas:

N(S) 27(4) – 300 kg ha⁻¹

arba

Amonio salietra 200–250 kg ha⁻¹

Praėjus 7-10 dienų po pirmo tręšimo rekomenduojama patręšti augalus:

Amonio sulfatu 100–150 kg ha⁻¹

Priklausomai nuo piktžolių kiekio, jų botaninės įvairovės ir piktžolių dydžio:

Tombo™ 0,20 kg ha⁻¹ + Trolten™ 0,5 l ha⁻¹ (šiam mišiniui papildomų paviršiaus aktyviųjų medžiagų nereikia)

arba

Timeline® FX 1,30 l ha⁻¹ + Trimmer® 500 WG 0,013 kg ha⁻¹

arba

Atevir® 0,20 kg ha⁻¹ + CDQ™ 0,026 kg ha⁻¹ + Biopower 1,30 l ha⁻¹ (sprendimas idealiai tinka pasėliams, kuriuose gausu vienametės miglės. Pakuotėje yra ir sprendimas veikiantis dviskiltę piktžolę, tad papildomai pridėti nieko nebereikia).

Augalų „streso“ mažinimui bei bendros augalų būklės gerinimui:

Agroplus Outrun 1,0 l ha⁻¹

Sosemba® 1,0 l ha⁻¹

Biospektrum WG 0,25 kg ha⁻¹

Šiuos produktus galima naudoti mišiniuose su Agroplus technologijos ar augalų apsaugos produktais.

Žieminiai rapsai

Dauguma pasėlių BBCH 27–29 augimo tarpsnyje.

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Sėkmingam augalų augimui ir vystymuisi reikalingas subalansuotas mineralinių medžiagų kiekis, o tai galima padaryti atliekant pagrindinį tręšimą biriomis azoto trąšomis.

Dėl plintančių stiebų kenkėjų svarbi kenkėjų kontrolė.

Dėl vyraujančių nepalankių oro sąlygų, ypač šalnų, augalai patiria „stresą“.

Rekomendacija

Azotiniam tręšimui rekomenduojame naudoti trąšas, jas išberiant iš karto ar kelių dienų intervalu:

N(S) 27(4) – 400 kg ha⁻¹ arba Amonio salietra 300–350 kg ha⁻¹

Amonio sulfatas 300–350 kg ha⁻¹

Apsaugai nuo kenkėjų:

Cythrín 500 0,05 l ha⁻¹

Augalų „streso“ mažinimui bei bendros augalų būklės gerinimui:

Agroplus Outrun 1,0 l ha⁻¹

Sosemba® 1,0 l ha⁻¹

Biospektrum WG 0,25 kg ha⁻¹

Šiuos produktus galima naudoti mišiniuose su Agroplus technologijos ar augalų apsaugos produktais.

Daugiau informacijos apie produktus, jų panaudojimą ir individualias rekomendacijas suteiks mūsų agronomai-konsultantai, su kuriais galite susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu.

