



局部麻醉指导

这个简要概述是关于在打针和手术时，最常用的局部麻醉药。您要经常跟您的医生沟通，看哪一种最适合您的孩子。

产品	可用性*	我能怎么用？	提前多久？	还有什么应该注意的
膏 LMX	药店或网上的非处方药	不要先擦皮肤（天然油会帮吸收。涂一点点，完全抹匀。接下来，涂一大块但不要抹。用塑料套把它盖住。	30分钟	您应该涂在不同的地方，这样能选针戳的位置。不会把血管变小。随身带着好！
膏 EMLA	通过处方	不要先擦皮肤（天然油会帮吸收。涂一点点，完全抹匀。接下来，涂一大块但不要抹。用塑料套把它盖住。	60分钟	您应该涂在不同的地方，这样能选针戳的位置。提前给医务人员打电话要处方。
贴膏 SYNERA	通过处方	剥，像创可贴贴。	20-30分钟	有可能会贵，但网上经常会有优惠券。对验血好，因为会把血管变大。提前给医务人员打电话要处方。
系统 J-TIP	医务人员	麻木皮肤也可以不用针，就用压缩的二氧化碳气将利多卡因压进皮肤的上面几层。医务人员做的时候会有啪的声音。	1-2分钟	你去买的地方有可能没有这种药，所以提前给他们打电话问有没有。这个药很快就能见效，所以没有那么多时间时，它是一个很好的选择。

*有些产品的可用性会取决于您的地点。

需要更多详细的信息，请到：megfoundationforpain.org



Meg Foundation
MEGFOUNDATIONFORPAIN.ORG