MONTROSE
REGIONAL HEALTH

CÓMO AYUDAR

PREVENGA UNA INFECCIÓN URINARIA:

ACERCA DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO:

Una infección del tracto urinario (ITU) puede desarrollarse cuando los gérmenes entran en el cuerpo a través de un tubo de plástico (catéter de Foley) utilizado para drenar la orina de la vejiga.

La vejiga, los riñones y la uretra pueden infectarse. También se conoce como CAUTI, por las siglas en inglés de Catheter Associated Urinary Tract Infection (infección urinaria asociada al catéter).

FACTORES DE RIESGO:

Uso de un catéter Foley y sistema de bolsa.

- ☐ **Cada día, pregunte si se puede retirar el catéter de Foley** (que se muestra a continuación).
- ☐ **Cuando ya no se necesite,** pida al médico que ordene la retirada del catéter Foley.
- ☐ **Pregunte por el plan de limpieza** del catéter Foley. (Lo ideal es a diario.)
- ☐ **No pierda de vista el tubo.** Si observa pliegues o enredos en la sonda, o si se produce un reflujo de orina, avise a una enfermera.

- ☐ **Asegúrese** de vaciar la bolsa de orina cuando esté llena.

LLAME A UNA ENFERMERA SI:

Su ser querido muestra signos de (o se queja de) lo siguiente:

- Escalofríos.
- Dolor de cuerpo.
- Confusión.
- Dolor lumbar.
- Temblores.
- Dolores de cabeza.
- Dolor o sensación de quemazón en la zona del estómago.
- Sangre en la bolsa de orina. *(Puede que vea un ligero color rosa.)*

NOTAS:

COPYRIGHT© 2023 THE CARE PARTNER PROJECT™