


# ブドウ樹

**緑の部分**  
新梢、葉、巻きひげ  
光合成、ブドウ樹の生育と維持

**収穫**  
100%手摘み、2～3週間かけて

**4地区**  
ヴァレ・ド・ラ・マルヌ、  
モンターニュ・ド・ランス、  
コート・デ・ブラン、  
コート・デ・パール




**根**  
水分とミネラル成分を吸い上げる  
ブドウ樹を定着させ、生命  
力と長寿の源となる


**品種**  
ヴィティス・ヴィニフェラ  
台木はアメリカ系品種

**7種のセパージュのみ使用**  
シャルドネ、  
ピノ・ブラン、プティ・メリエ、  
アルバンヌ、ピノ・グリ  
ピノ・ノワール、ムニエ


ピノ・ノワール



シャルドネ



ムニエ



モンターニュ・ド・ランス  
コート・デ・パール

発芽:2番目      熟成:1番目  
葉は五角形で葉柄の裂刻(くぼみ)  
は雄鶏のとさか型

コート・デ・ブラン、コート・ド・セザン  
ヌ、ウイトリー丘陵地帯、モングー

発芽:1番目      熟成:3番目  
葉はほぼ円形で葉柄の裂刻(くぼみ)  
は大きく開いたU字形

ヴァレ・ド・ラ・マルヌ

発芽:3番目      熟成:2番目  
若葉はうぶ毛におおわれている

\* AOCシャンパーニュの平均データ

## 4種類の仕立て方に限定

目的:ブドウ樹の樹勢と結実のバランスをとるため。剪定には免許が必要。

コルドン・ド・ロワイヤ



葉と結実のバランス  
ピノ・ノワールに多い

シャブリ



樹のバランスが良い  
シャルドネに最適

ギューヨ



シンプルで合理的な仕立て  
全セパージュに可能

ヴァレ・ド・ラ・マルヌ



結実を促進  
ムニエに限定



この世でブドウ畑での畑仕事にまさる重要な作業はない。



ヴォルテール