

Dræn i øret - Aarhus (Tubulation)





Velkommen til Budolfi Privathospital

I denne pjece kan du læse, hvordan du forbereder dit barn til at få lagt dræn i ørerne, og hvad du kan forvente i tiden efter indgrebet.

Hos børn, der ofte er forkølede, kan der ophobe sig væske eller slim i mellemøret. Det kan påvirke trommehindens bevægelighed og føre til nedsat hørelse. Du vil måske opleve, at dit barn ikke hører så godt, som det plejer, eller virker mere uopmærksomt.

Væsken i mellemøret kan også give ubehag, trykken og smerter – især når barnet ligger ned. Det kan gøre det svært at finde ro, særligt om natten.

I nogle tilfælde kan væsken udvikle sig til mellemørebetændelse. Det ses ofte med feber, og i visse tilfælde kan trommehinden sprænge, hvilket giver udflåd fra øret.

Formålet med at lægge dræn er at afhjælpe disse problemer og forbedre barnets hørelse og trivsel.

Vi anbefaler, at du læser hele denne pjece inden din operation. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på TLF: 70 11 11 66.

1. Forberedelse til operationen

1.1 Medicin

Der laves en recept på øredråber, som kan indløses ved behov (fx flåd mere end 3 dage efter drænanlæggelse.

1.2 Planlæg sygemelding

Barnet bør holdes hjemme samme dag som drænanlæggelsen, herefter er der ingen restriktioner.

1.3 Hygiejne

Barnet bliver opereret i sit eget tøj. Af hensyn til hygiejnen på operationsgangen, bedes man tage behageligt og rent tøj på – dog ingen strømpebukser, da iltmåleren påsættes på tæerne.

Barnet må ikke have neglelak på.



1.4 Faste

Barnet skal være fastende op til operationen. Derfor skal de følge disse retningslinjer:

 	 	 	
Indtil 6 timer før operationen	6-2 timer før operationen	Mindre end 2 timer før operationen	Mødetiden på Budolfi Privathospital
Al mad og drikke.	INGEN mad – kun drikkeelse.	INGEN mad og drikke.	
Frem til 6 timer før din operationstid på Budolfi Privathospital må spise og drikke som vanligt.	Frem til 2 timer før din operationstid på Budolfi Privathospital må du drikke tynde væsker som kan være følgende: Sød saftvand. Juice uden frugtkød. Kaffe / the uden mælkeprodukter. Sodavand. Barnet skal faste i 4 timer for brystmælk.	2 timer før din operationstid på Budolfi Privathospital må du ikke spise eller drikke noget. INGEN bolcher eller tyggegummi.	

1.5 Sevofloran / bedøvelse

Indgrebet foregår i fuld bedøvelse for at sikre barnets tryghed. Til dette bruger vi en skånsom form for bedøvelse, hvor barnet falder i søvn ved at indånde en gas (sevofluran) gennem en maske.

Bedøvelsen virker hurtigt og gør, at barnet falder roligt i søvn uden brug af nåle. Det er normalt, at barnet kortvarigt kan blive lidt uroligt lige inden det sover. Når barnet sover, gennemføres selve indgrebet, som varer cirka 10–15 minutter. Efterfølgende vågner barnet hurtigt op igen og bliver passet godt på af vores personale i opvågningsrummet, hvor I som forældre kan være med.

Sevofluran er en meget sikker bedøvelsesform, der bruges rutinemæssigt til børn. Alvorlige bivirkninger er meget sjældne. Nogle børn kan være lidt kede af det, forvirrede eller kortvarigt utilpasse lige efter opvågning – det er helt normalt og går hurtigt over.

Har I spørgsmål før indgrebet, er I altid velkomne til at kontakte os.

1.6 Transport

Du er selv ansvarlig for transporten til og fra hospitalet. Dit barn skal ledsages af en voksen ud over chaufføren under hjemtransporten.

Kommer du hertil med offentlig transport, stopper bussen (linje 12) og letbanen (linje L1) maks. 500 meter fra Budolfi Privathospitals klinik i Århus.

1.7 Sygdom inden operationsdagen

Hvis jeres barn er sygt på operationsdagen, f.eks. med feber, hoste eller forkølelse, beder vi jer kontakte os, da bedøvelsen i så fald kan blive udsat.

Opkastning inden for det sidste døgn medfører aflysning på grund af risiko for opkast til lungerne i forbindelse med bedøvelsen.



2. På operationsdagen

2.1 Modtagelse

I bliver modtaget af en sygeplejerske, som vil klargøre barnet til operationen.

Inden operationen vil I komme til at tale med kirurgen, som skal operere barnet og anæstesilægen, som står for bedøvelsen.

Bedøvelsen gives via en maske af narkoselægen, og den bedøvende gas hedder Sevofluran. Barnet falder i søvn inden for cirka ét minut.

Som forældre bliver I hos barnet, indtil det sover trygt. Herefter beder vi jer vente i vores venteområde, mens barnet bliver behandlet og senere kommer retur til opvågningen.

Skulle I mod forventning være forhindret i at møde op til aftalt tid på operationsdagen, eller på anden måde have brug for at komme i kontakt med os uden for åbningstiden, kan I kontakte os på telefonnummer 54 34 71 52.

Telefonen er åben fra kl. 7:00 og kun brugbar på operationsdagen.

2.2 Operation

Kirurgen skærer et lille hul i barnets trommehinde og suger væsken/slimen ud. Drænet sættes ind i hullet og der er nu luft i mellemøret.

Operationen tager omkring 10 minutter inkl. bedøvelse.

2.3 Pårørende

Mens dit barn er til behandling, er pårørende velkomne til at vente i et lille venteområde





3. Efter operationen

3.1 Opvågning

Efter operationen bliver dit barn overvåget af en sygeplejerske i opvågningsafsnittet. Det er helt normalt, at barnet kan være uroligt og græde, når det vågner – det skyldes virkningen af bedøvelsen. De fleste børn husker ikke denne del bagefter.

Når barnet er vågent, tilbydes der let forplejning i opvågningen. Herefter er man velkommen til at tage hjem.

I er velkommen til selv at medbringe barnets yndlingsmad

3.2 Smerter

Ofte har man ikke ondt efter drænanlæggelse, ellers kan der købes Panodil i håndkøb.



3.3 Når du kommer hjem

Det kan flyde et par dage fra det ny-opererede ører. Fortsætter dette til 3. dagen opstartes behandling med øre dråber (Recept ligger på serveren).

Der kan også sive lidt med frisk blod fra opererede ører den første dag. Hvis det flyder - også når barnet ikke er ny-opereret, må der gerne skylles med saltvand.

Børn må gerne komme i svømmehal med dræn, men de må helst ikke dykke. Man kan købe specielle ørepropper på apoteket.

Hvis ikke øredråberne virker og det fortsætter med ørepuds, skal I kontakte Budolfi Privathospital.

Ved akut opståede komplikationer i forbindelse med kirurgi uden for åbningstid, kontakt vagthavende læge på TLF: 70 11 11 66.


4. Kontrol

Efter operationen tilbydes der én planlagt kontrol seks uger senere for at sikre, at drænene fungerer som de skal, og at barnets ører heler fint.



Find vej

Rolighedsvej 30,
8240 Risskov



Parkering

Der er gratis parkeringsmuligheder både foran og bagved klinikken.



Kontakt

**Vandmanden 10E,
9200 Aalborg SV**

+45 70 11 11 66

Telefontid: 8:00 - 14:00

Info@budolfiprivathospital.dk

www.budolfiprivathospital.dk