

Agrokoncernas pataria

2025 06 12



PASĖLIŲ BŪKLĖ IR ARTIMIAUSI DARBAI

2025 06 12

Meteorologinės sąlygos

Birželio mėnesio viduryje vyrauja šilti su lietumi orai. Kritulių sulaukė visi šalies rajonai, tačiau iškritęs kritulių kiekis skiriasi. Vidutinė paros oro temperatūra fiksuojama 15-16 °C. Dirvos temperatūros vidurkis 10, 20 ir 50 cm gylyje yra apie 14 °C. Dirvožemio vidutinis drėgnumas, palyginti su praėjusia savaitė, gilesniuose sluoksniuose išliko panašus, o dirvos paviršiuje yra padidėjęs (10 cm gylyje – 28,4 proc., 20 cm gylyje – 27,4 proc., o 50 cm gylyje yra 31 proc.).

Šalies zonos	Vidutinė dirvos temperatūra, °C			Vidutinė dirvos drėgmė, proc.		
	10 cm	20 cm	50 cm	10 cm	20 cm	50 cm
Šiaurės	11,3-14,2	12,7-14,3	12,6-15,7	24,5-43,7	23,8-40,5	8,9-41,9
Pietų	10,6-14,7	12,4-14,8	12,9-15,8	19,8-34,3	13,0-34,2	16,4-45,6
Vakarų	10,5-12,9	11,8-13,4	12,1-14,6	12,3-39,6	10,9-45,8	31,0-45,8
Rytų	12,8-14,4	12,7-15,8	12,8-16,2	18,8-40,2	10,6-36,0	13,5-43,8
Vidurio	12,2-14,7	12,2-15,5	12,4-15,6	18,4-34,0	10,8-35,5	12,9-36,4

Vasariniai kviečiai

Dauguma pasėlių BBCH 37-39 augalų augimo tarpsnyje. Vyraujančios oro sąlygos yra palankios augalų augimui ir vystymuisi.

Augalai greitai pasieks žydėjimo tarpsnį (BBCH 61-63).

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Oro sąlygos šiuo metu yra ypač palankios varpų fuzariozei ir septoriozei.

Vyrauja šilti su lietumi orai. Dažnai formuojasi rūkas, susidaro rasa, todėl santykinė oro drėgmė išlieka aukšta.

Taip pat išlieka didelė kenkėjų plitimo rizika vasariniuose kviečiuose. Būtina apsaugoti augalus nuo kenkėjų daromos žalos.

Rekomendacija

Apsaugai nuo grybinių ligų (BBCH 61-63):

Juventus® 90 0,6 l ha⁻¹ + Patel 300 EC 0,5 l ha⁻¹

Apsaugai nuo kenkėjų:

Nexide® CS 0,05 l ha⁻¹ arba Cythrin 500 0,05 l ha⁻¹

Visuose purškimo mišiniuose rekomenduojame tinkamai reguliuoti vandens tirpalo pH ir papildomai panaudoti produktą **AgroHelp pH 0,4 l ha⁻¹**. Siekiant geresnio augalų apsaugos produktų padengimo, rekomenduojame naudoti **AgroHelp Silicon 0,1 l ha⁻¹**.

Vasariniai miežiai

Dauguma pasėlių BBCH 37-39 augalų augimo tarpsnyje.

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Vyraujančios oro sąlygos yra palankios ne tik augalų augimui ir vystymuisi, bet ir kenksmingųjų organizmų plitimui.

Intensyviai augant augalams atsiranda didesnis mineralinių medžiagų poreikis, o tai galima padaryti juos tręšiant per lapus.

Bamblėjimo tarpsnio metu turime priimti augalų augimo reguliavimo sprendimus bei apsaugoti augalus nuo grybinių ligų ir kenkėjų.

Rekomendacija

Maitinamasis purškimas per lapus:

Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha⁻¹ + Agrotop Javams Pro 0,7 l ha⁻¹ + Agroplus Super KS 2,0 l ha⁻¹

Apsauga nuo ligų:

Syrex™ 0,75 l ha⁻¹

Syrex™ 0,4–0,5 l ha⁻¹, jei purškimas buvo atliktas BBCH 32

Augalų augimo reguliavimui:

Terpal® 1,0 l ha⁻¹

Apsaugai nuo kenkėjų:

Nexide® CS 0,05 l ha⁻¹ arba **Cythrín 500 0,05 l ha⁻¹**

Visuose purškimo mišiniuose rekomenduojame tinkamai reguliuoti vandens tirpalo pH ir papildomai panaudoti produktą **AgroHelp pH 0,4 l ha⁻¹**. Siekiant geresnio augalų apsaugos produktų padengimo, rekomenduojame naudoti **AgroHelp Silicon 0,1 l ha⁻¹**.

Šiuos produktus galima naudoti mišiniuose su Agroplus technologijos ar augalų apsaugos produktais.

Sėjamieji žirniai ir lauko pupos

Dauguma pasėlių BBCH 55–59 augalų augimo tarpsnyje, o ankstyvesnės sėjos pasėlių augalai pasiekę žydėjimo tarpsnį (BBCH 61–63).

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Oro sąlygos šiuo metu yra ypač palankios grybinių ligų (askochitozės, šokoladinės dėmėtligės, pilkojo puvinio, miltligės) plitimui.

Taip pat išlieka palankios oro sąlygos kenkėjų migracijos aktyvumui ir gausumui, todėl būtina stebėti pasėlius.

Azotą fiksuojančių bakterijų gumbeliai tampa nebeaktyvūs pupinių augalų žydėjimo tarpsnio metu, todėl būtina augalus pamaitinti.

Rekomendacija

Apsauga nuo ligų 2 kartus žydėjimo tarpsnio pradžioje ir žydėjimo tarpsnio antroje pusėje:

Pictor® Active 0,5 l ha⁻¹ (BBCH 61–63)

Pictor® Active 0,5 l ha⁻¹ (BBCH 65–67)

Apsaugai nuo kenkėjų:

Nexide® CS 0,05 l ha⁻¹ (BBCH 61–63)

Vantex® CS 0,05 l ha⁻¹ (BBCH 65–67)

Tręšimas azoto trąšomis augalams pasiekus žydėjimo tarpsnio pabaigą (BBCH 67–69):

Amonio sulfatas 150 kg ha⁻¹ fizinio svorio

Visuose purškimo mišiniuose rekomenduojame tinkamai reguliuoti vandens tirpalo pH ir papildomai panaudoti produktą **AgroHelp pH 0,4 l ha⁻¹**. Siekiant geresnio augalų apsaugos produktų padengimo, rekomenduojame naudoti **AgroHelp Silicon 0,1 l ha⁻¹**.

Cukriniai runkeliai

Šiuo metu cukrinių runkelių pasėliuose fiksuojamas lapų vystymosi tarpsnis (BBCH 18–30).

Palankiomis oro sąlygomis cukrinių runkelių augalai sparčiai vystosi ir auga, augalų lapija pradeda dengti tarpueilius.

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Po herbicidinių purškimų, kad būtų užtikrintas ne tik geras augalų augimas, bet ir vystymasis, reikalingas tręšimas per lapus.

Taip pat reikia stebėti cukrinių runkelių pasėlius ir aptikus kenkėjus, ypač pupinius amarus, kartu su Agroplus technologijos produktais panaudoti insekticidus.

Pastebėjus grybinių ligų pirmus simptomus, esant 3–5 proc. pažeistų augalų lapų, būtina apsauga nuo grybinių ligų, ypač baltulių, ramularijos, miltligės ir rudųjų rūdžių.

Rekomendacija

Maitinamasis purškimas per lapus (BBCH 18–35):

BlueN™ 0,33 kg ha⁻¹ + Agroplus Extra Mo-B 1,0 l ha⁻¹ + Agroplus UniPro 0,5 l ha⁻¹ + Agrotop No. 1 Pro 1,0 l ha⁻¹

Maitinamasis purškimas per lapus (BBCH 37–39):

Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha⁻¹ + Agrotop Boras 2,0 l ha⁻¹ + Agroplus UniPro 1,0 l ha⁻¹

Apsauga nuo ligų 2 kartus:

Revystar® XL 0,5 l ha⁻¹ (BBCH 39)

Revystar® XL 0,5 l ha⁻¹ (BBCH 40–45)

Apsaugai nuo kenkėjų:

Nexide® CS 0,05 l ha⁻¹

Visuose purškimo mišiniuose rekomenduojame tinkamai reguliuoti vandens tirpalo pH ir papildomai panaudoti produktą **AgroHelp pH 0,4 l ha⁻¹**. Siekiant geresnio augalų apsaugos produktų padengimo, rekomenduojame naudoti **AgroHelp Silicon 0,1 l ha⁻¹**.

Šiuos produktus galima naudoti mišiniuose su Agroplus technologijos ar augalų apsaugos produktais.

Kukurūzai

Šiuo metu kukurūzų pasėliuose fiksuojama lapų vystymosi tarpsnio pabaiga (BBCH 16–18).

Augalai intensyviau pradeda augti nuo stiebo ilgėjimo tarpsnio pradžios (BBCH 30).

Skirtinguose šalies rajonuose kukurūzų augalų vystymosi tarpsnis labai skiriasi, todėl priimant technologinius sprendimus būtina atsižvelgti į pasėlių būklę.

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Esant intensyviai augalų augimui ir vystymuisi, augalams išlieka didesnis mineralinių medžiagų poreikis sėkmingiems fiziologiniams, biologiniams ir cheminiams procesams.

Agroplus technologijos produktų naudojimas padeda subalansuoti reikiamą mineralinių medžiagų kiekį augaluose, ypač tuomet, kai atsiranda mikroelementų trūkumo požymiai arba siekiant sudaryti geresnes sąlygas augalų atsigavimui po stresinių situacijų. Taip pat pagerina cheminių elementų įsisavinimą tiek per lapus, tiek per šaknis.

Rekomendacija

Tręšimas per lapus augalams pasiekus BBCH 14 augimo tarpsnį:

Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha⁻¹ + Agroplus Kukurūzams Pro 2,0 l ha⁻¹

Piktžolių kontrolė ir tręšimas per lapus augalams pasiekus BBCH 16 augimo tarpsnį:

BlueN™ 0,33 kg ha⁻¹ + Maister Power OD 1,0 l ha⁻¹

Tręšimas per lapus augalams pasiekus BBCH 18 augimo tarpsnį:

Agrotop Boras $1,0 \text{ l ha}^{-1}$ + Agroplus Manganas $0,3 \text{ l ha}^{-1}$ + Sosemba™ $2,0 \text{ l ha}^{-1}$

Tręšimas per lapus augalams pasiekus BBCH 30–35 augimo tarpsnį:

Agroplus Javams $0,4 \text{ l ha}^{-1}$ + Agroplus Super KS $1,0 \text{ l ha}^{-1}$

Visuose purškimo mišiniuose rekomenduojame tinkamai reguliuoti vandens tirpalo pH ir papildomai panaudoti produktą **AgroHelp pH $0,4 \text{ l ha}^{-1}$** . Siekiant geresnio augalų apsaugos produktų padengimo, rekomenduojame naudoti **AgroHelp Silicon $0,1 \text{ l ha}^{-1}$** .

Šiuos produktus galima naudoti mišiniuose su Agroplus technologijos ar augalų apsaugos produktais.

Daugiau informacijos apie produktus, jų panaudojimą ir individualias rekomendacijas suteiks mūsų agronomai-konsultantai, su kuriais galite susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu.

