

Agrokoncernas pataria

2025 04 30



PASĖLIŲ BŪKLĖ IR ARTIMIAUSI DARBAI

2025 04 30

Meteorologinės sąlygos

Balandžio mėnesio antroje pusėje vyrauja vėsūs, vėjuoti ir sausi orai. Šiuo metu vidutinė oro temperatūra siekia 5 °C, įdienojus pakyla iki 15 °C. Sulaukėme šalnų dirvos paviršiuje (nuo 0 iki -6 laipsnių šalčio ir daugiau).

Šalies zonos	Vidutinė dirvos temperatūra, °C			Vidutinė dirvos drėgmė, proc.		
	10 cm	20 cm	50 cm	10 cm	20 cm	50 cm
Šiaurės	6,0-11,5	6,8-10,2	7,4-9,9	12,5-24,2	21,1-35,9	7,6-36,7
Pietų	7,3-12,8	7,6-11,1	7,9-12,0	10,5-24,9	12,2-31,3	12,5-48,5
Vakarų	5,1-9,4	5,7-8,5	7,2-9,9	14,1-27,3	19,1-33,0	30,0-45,0
Rytų	8,1-10,4	5,7-8,9	6,7-10,4	12,0-28,2	7,5-33,1	12,5-42,8
Vidurio	6,6-10,1	6,3-9,8	8,1-10,5	8,0-29,9	11,7-32,8	2,3-35,9

Vasariniai kviečiai

Dauguma pasėlių BBCH 13–21 augimo tarpsnyje.

Vėlyvesnės sėjos pasėliai BBCH 09–13 augimo tarpsnyje, augalai sudygę ir turi pirmus lapelius.

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Augalai sparčiai auga ir vystosi, atsiranda didesnis mineralinių medžiagų poreikis, o tai galima padaryti juos tręšiant per lapus.

Lapų vystymosi ir krūmijimosi tarpsnio metu turime priimti sprendimus, kurie paskatintų augalų krūmijimąsi.

Piktžolės ne tik dygsta, bet ir auga daug greičiau nei lauko augalai, todėl būtina piktžolių kontrolė. Jaunus vasarinių kviečių augalus pažeidžia javinės spragės – svarbi kenkėjų kontrolė.

Dėl vyraujančių nepalankių oro sąlygų, ypač šalnų, augalai patiria „stresą“.

Rekomendacija

Maitinamasis purškimas per lapus ir augalų krūmijimosi skatinimas:

Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha⁻¹ + Agrotop No. 1 Pro 1,0 l ha⁻¹ + Agrotop Javams Pro 0,7 l ha⁻¹ + Agroplus Super KS 1,0 l ha⁻¹ + Stabilan® 750 SL 1,0 l ha⁻¹

Priklausomai nuo piktžolių kiekio, jų botaninės įvairovės bei piktžolių dydžio:

Primus® / Nuance® 75 WG 0,08 vnt. ha⁻¹ + AgroSwap 0,2 l ha⁻¹

Vėlesnė piktžolių kontrolė, ypač apsaugai nuo vienaskilčių piktžolių (tuščiosios avižos ar dirvinės smilguolės):

Tombo™ 0,15 kg ha⁻¹ + Trolten™ 0,4 l ha⁻¹ (šiam mišiniui papildomų paviršiaus aktyviųjų medžiagų nereikia) arba

Timeline® FX 1,25 l ha⁻¹ + Trimmer® 500 WG 0,0125 kg ha⁻¹

Apsaugai nuo kenkėjų:

Nexide® CS 0,05 l ha⁻¹ arba Cythrin 500 0,05 l ha⁻¹

Augalų „streso“ mažinimui bei bendros augalų būklės gerinimui:

Agroplus Outrun 1,0 l ha⁻¹

Seamac® OR 1,0 l ha⁻¹

Biospektrum WG 0,25 kg ha⁻¹

Šiuos produktus galima naudoti mišiniuose su Agroplus technologijos ar augalų apsaugos produktais.

Vasariniai miežiai

Dauguma pasėlių BBCH 13–21 augimo tarpsnyje.

Vėlyvesnės sėjos pasėliai BBCH 09–13 augimo tarpsnyje, augalai sudygę ir turi pirmus lapelius.

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Augalai sparčiai auga ir vystosi, atsiranda didesnis mineralinių medžiagų poreikis, o tai galima padaryti juos tręšiant per lapus.

Piktžolės ne tik dygsta, bet ir auga daug greičiau nei lauko augalai, todėl būtina piktžolių kontrolė. Jaunus vasarinių miežių augalus pažeidžia javinės spragės – svarbi kenkėjų kontrolė.

Dėl vyraujančių nepalankių oro sąlygų, ypač šalnų, augalai patiria „stresą“.

Rekomendacija

Maitinamasis purškimas per lapus:

Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha⁻¹ + Agrotop No. 1 Pro 1,0 l ha⁻¹ + Agrotop Javams Pro 0,7 l ha⁻¹ + Agroplus Super KS 1,0 l ha⁻¹

Priklausomai nuo piktžolių kiekio, jų botaninės įvairovės bei piktžolių dydžio:

Primus® / Nuance® 75 WG 0,08 vnt. ha⁻¹ + AgroSwap 0,2 l ha⁻¹

Vėlesnė piktžolių kontrolė, ypač apsaugai nuo vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių:

Timeline® FX 1,25 l ha⁻¹ + Trimmer® 500 WG 0,0125 kg ha⁻¹

Apsaugai nuo kenkėjų:

Nexide® CS 0,05 l ha⁻¹ arba Cythrin 500 0,05 l ha⁻¹

Augalų „streso“ mažinimui bei bendros augalų būklės gerinimui:

Agroplus Outrun 1,0 l ha⁻¹

Seamac® OR 1,0 l ha⁻¹

Biospektrum WG 0,25 kg ha⁻¹

Šiuos produktus galima naudoti mišiniuose su Agroplus technologijos ar augalų apsaugos produktais.

Sėjamieji žirniai ir lauko pupos

Dauguma pasėlių BBCH 09–12 augimo tarpsnyje.

Vėlyvesnės sėjos pasėliai dar nesudygę ar tik pradeda matytis virš dirvos paviršiaus.

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Augalus efektyviai apsaugoti nuo piktžolių verta dar ankstyvaisiais augimo tarpsniais (kol piktžolės dar mažos). Vėlinant herbicidų purškimo darbus, produktų efektyvumas, apsaugant augalus nuo piktžolių, mažėja.

Jaunus sėjamųjų žirnių ir lauko pupų lapus pažeidžia sitonai. Gausiai išplitus sitonams, jie apgraužia ne tik lapus, bet ir augimo kūgelius.

Rekomendacija

Apsaugai nuo piktžolių:

Fenix® 600 SC 3,0 l ha⁻¹ (BBCH 00-09)

arba

Stomp® CS 1,5-2,0 l ha⁻¹ (BBCH 00-09) ir vėliau Corum® 1,0 l ha⁻¹ + Dash 1,0 l ha⁻¹ (BBCH 14-15)

Apsaugai nuo kenkėjų:

Mavrik® 0,2 l ha⁻¹

Cukriniai runkeliai

Šiuo metu ankstyvos sėjos cukrinių runkelių pasėliuose fiksuojami skilčialapių arba dar dygstančių augalų tarpsniai (BBCH 07-10).

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Daugumoje pasėlių pagrindinis tręšimas kompleksinėmis trąšomis ir azoto trąšomis buvo atliktas dar prieš sėją. Jei prieš sėją buvo tręšta tik kompleksinėmis NPK trąšomis, reikėtų atlikti tręšimą azoto trąšomis.

Augalų lapų vystymosi tarpsniu (BBCH 10-18) pagrindinis ir svarbiausias auginimo technologijos etapas yra piktžolių kontrolė.

Rekomendacija

Tręšimas azoto trąšomis:

Amonio salietra 200 kg ha⁻¹ fizinio svorio, kuomet nebuvo išberta prieš sėją

Amonio sulfatas 120 kg ha⁻¹ fizinio svorio, augalams sudyngus

Piktžolių kontrolė atliekama keliais etapais:

Pirmojo purškimo metu (BBCH 07-09):

AgroHelp pH 0,4 l ha⁻¹ + Goltix® Gold 1,45 l ha⁻¹ + Ethosat® 0,45 l ha⁻¹ + PowerOil 1,0 l ha⁻¹

Antrojo purškimo metu (BBCH 10-12):

AgroHelp pH 0,4 l ha⁻¹ + Goltix® Gold 1,45 l ha⁻¹ + Ethosat® 0,45 l ha⁻¹ + PowerOil 1,0 l ha⁻¹



Daugiau informacijos apie produktus, jų panaudojimą ir individualias rekomendacijas suteiks mūsų agronomai-konsultantai, su kuriais galite susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu.

