

Agrokoncernas pataria

2025 10 08



PASĖLIŲ BŪKLĖ IR ARTIMIAUSI DARBAI

2025 10 08

Meteorologinės sąlygos

Spalio mėnesio pradžioje vyrauja vėsesni, saulėti ir vėjuoti orai, o kritulių sulaukė tik pavieniai rajonai. Vidutinė paros oro temperatūra fiksuojama virš 9,5 °C. Dirvos temperatūros vidurkis 10, 20 ir 50 cm gylyje atitinkamai yra apie 9,7–10,7 °C. Dirvožemio vidutinis drėgnumas gilesniuose sluoksniuose yra 15,7–43,2 proc., 20 cm gylyje 15,9–37,0 proc., 10 cm gylyje 12,9–32,9 proc.

Šalies zonos	Vidutinė dirvos temperatūra, °C			Vidutinė dirvos drėgmė, proc.		
	10 cm	20 cm	50 cm	10 cm	20 cm	50 cm
Šiaurės	9,3-10,1	9,8-10,3	9,8-10,8	16,1-31,6	15,3-37,0	20,4-42,8
Pietų	9,3-10,9	9,5-11,1	9,5-11,9	7,9-33,9	13,9-34,3	12,5-48,6
Vakarų	9,3-10,0	9,1-10,1	9,4-11,9	23,5-39,4	29,0-45,8	19,8-43,4
Rytų	9,1-10,3	8,7-10,6	9,5-11,2	9,6-28,6	10,6-34,7	12,8-42,7
Vidurio	9,2-10,6	9,5-10,6	9,3-11,1	7,6-30,8	10,9-33,4	12,8-38,3

Žieminiai javai

Žieminių javų sėja skirtinguose šalies regionuose vyko skirtingai. Pirmieji žieminių javų plotai buvo pasėti dar rugsėjo pradžioje, kiti laukai – rugsėjo paskutinėmis dienomis.

Lapų vystymosi ir krūmijimosi tarpsnio pradžia (BBCH 09-21)

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Svarbią vietą žieminių javų auginimo technologijoje užima tręšimas. Paprastai kompleksinėmis ar vienanarėmis trąšomis augalus patręšiame dar prieš sėją. Be pagrindinio tręšimo rekomenduojame atlikti papildomą tręšimą per lapus, esant 2 ir daugiau lapelių tarpsniui ar krūmijimosi tarpsnio pradžioje. Tiek makro-, tiek mikroelementai dalyvauja gyvybiškai svarbiuose procesuose, kurie vyksta augaluose (tinkamas augalų pasiruošimas žiemojimui).

Rekomendacija

Maitinamasis purškimas per lapus (BBCH 12–21):

Agrotop No. 1 Pro 1,0 l ha⁻¹ + Agroplus Javams 0,5 l ha⁻¹

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Pagrindiniai ir svarbiausi rudeniniai darbai žieminių javų pasėliuose – piktžolių ir kenkėjų kontrolė. Plataus veikimo herbicidų panaudojimas žieminių javų pasėliuose rudenį yra naudingas, nes:

- Žieminių javų augalai nepatiria konkurencijos dėl mineralinių medžiagų, šviesos, vandens ar erdvės;
- Sumažėja galimybė plisti kenkėjams ir ligoms;
- Žieminių javų augalai lengviau žiemoja;
- Pavasarį peržiemojusių javų pasėlių nereikia skubėti purkšti herbicidais, dėl to daug lengviau sulaukti šiltesnių ir purškimams palankesnių oro sąlygų;
- Pavasarį atliekami herbicidiniai purškimai yra efektyvesni mažesnėmis normomis dėl mažesnio kiekio po žiemos likusių piktžolių;
- Dažnu atveju pakanka sunaikinti tik vėliau sudygusias dviskiltes piktžoles, o tokia piktžolių kontrolė reikalauja mažesnių išlaidų;
- Iš rudens nuo piktžolių apsaugotuose žieminių javų pasėliuose yra kur kas lengviau atlikti ankstyvą augalų augimo reguliavimą, išvengiant lauko augalams nepageidaujamą stresą keliančių mišinių;
- Anksti pavasarį žieminiai javai nepatiria konkurencijos su piktžolėmis.

SVARBU! Pasirenkant piktžolių kontrolės sprendimus, pirmiausia reikia įsivertinti žieminių javų pasėliuose turimą piktžolių įvairovę, jų kiekį bei jų dygimo laiką.

Rekomendacija

Apsauga nuo piktžolių (BBCH 12-21):

Roxy 800 EC 2,0 l ha⁻¹ + Saracen Delta® 0,075 l ha⁻¹

Sprendžiami iššūkiai šiuo laikotarpiu

Jaunus žieminių kviečių augalus turime apsaugoti nuo kenkėjų jau rudenį, nes javuose plintantys amarai kenkia ne tik patiems augalams, bet ir platina virusines ligas. Jau keletą metų iš eilės, brendimo tarpsniu, javų pasėliuose matome pajuodusias ir tuščias varpas. Tokio tipo pažeidimų randame ne tik žieminių kviečių, bet ir kvietrugių ar miežių pasėliuose.

Kitas nemažiau žalingas kenkėjas žieminiuose javuose – švedinė muselė (*Oscinella frit*). Šio kenkėjo lervos jau rudenį kenkia daigams. Lervos pažeidžia augalų krūmijimosi mazgą. Pažeidimo pradžioje lapeliai pagelsta, vėliau nudžiūsta, atskirais atvejais gali žūti ir visas augalas. Pavasarį, atsinaujinus augalų vegetacijai, galima matyti pažeistus augalus su išdžiūvusiais centriniais lapeliais, deformuotais, sustorėjusiais stiebais, iš kurių vėliau nebesusiformuoja varpa.

Rekomendacija

Apsaugai nuo kenkėjų (BBCH 13-15):

Cythrín 500 0,05 l ha⁻¹

Daugiau informacijos apie produktus, jų panaudojimą ir individualias rekomendacijas suteiks mūsų agronomai-konsultantai, su kuriais galite susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu.

