Guía de flora y avifauna

HUMEDAL DE CURANIPE

Región del Maule

Humedal Costero, Estuario de Curanipe

Los humedales costeros corresponden a ecosistemas acuáticos que albergan una enorme biodiversidad, con altos niveles de endemismo y que son de vital importancia para numerosas especies de aves. Tienen también una importante relevancia socio-cultural por su belleza y por los servicios ecosistémicos que proporcionan a las comunidades locales. Pese a esto son muy frágiles, al estar expuestos a una gran presión antrópica y ser muy susceptibles al cambio climático.

El Humedal Costero de Curanipe corresponde a un Estuario, que por definición son "cuerpos de agua semicerrados, que se forman cuando las aguas dulces provenientes de ríos y quebradas fluyen hacia el océano y se mezclan con el agua salada del mar". Los estuarios y sus zonas aledañas son áreas de transición entre tierra y mar, y entre agua dulce y agua salada.

En esta guía podrás encontrar fichas de reconocimiento de las principales especies de avifauna presentes en el estuario de Curanipe, junto a la fotografía de cada ejemplar incluímos información básica para su identificación y sus principales características. También incluimos algunas especies de flora que tienen un importante rol en este ecosistema estuarino.

USO DE LA GUÍA DE FLORA Y AVIFAUNA

Cada lámina en esta guía posee información general sobre las aves y plantas presentes en el Humedal de Curanipe.

Captura real de los especímenes avistados en la zona costera y en específico el Humedal de Curanipe, en distintas temporadas durante el año.

En esta sección podrás obtener detalles de los rasgos que diferencian a las aves de la misma especie, pero de distinto género o grado de madurez.

PARTES Y PLUMAS DE UN AVE

Entendiendo las partes y el plumaje de un ave, nos podemos hacer una mejor idea de los dimorfismos sexuales que en esta guía se describen, esta diferencia entre aves es definida por las variaciones en la fisonomía externa, forma, coloración o tamaño, del macho, hembra, inmaduro y juvenil de una misma especie.



LISTA ROJA DE UICN

La Lista Roja de Especies Amenazadas de la ***Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza*** *es un indicador crítico de la salud de la biodiversidad del mundo.*

Provee información acerca de distribución, tamaño poblacional, hábitat y ecología, uso y/o tráfico, amenazas, y acciones de conservación que ayudarán a brindar información para decisiones de conservación necesarias.

Puedes encontrar y buscar las especies de tu interés visitando en línea la lista completa de UICN en ***www.iucnredlist.org/es***

CATEGORÍAS

- NE — No Evaluado
- NA — No Aplica
- DD — Datos insuficientes
- LC — Menor Riesgo
- NT — Amenzado
- VU — Vulnerable
- EN — En Peligro
- CR — En Peligro Crítico
- RE — Extinto a Nivel Regional
- EW — Extinto en Estado Silvestre
- EX — Extinto

Aves

Becacina *(Gallinago paraguaiae)* 06
Blanquillo *(Podiceps occipitalis occipitalis)* 07

Cachudito *(Anairetes parulus)* 08
Chercán *(Troglodytes aedon)* 09
Chincol *(Zonotrichia capensis)* 10
Chirihue *(Sicalis luteola)* 11
Chorlo Chileno *(Charadrius modestus)* 12
Chorlo de Collar *(Charadrius collaris)* 13
Churrete Común *(Cinclodes patagonicus chilensis)* 14
Cisne Coscoroba *(Coscoroba coscoroba)* 15
Cisne de Cuello Negro *(Cygnus melanocoryphus)* 16
Colegial *(Lessonia rufa)* 17
Colibrí Gigante *(Patagona gigas gigas)* 18
Cometocino Patagónico *(Phrygilus patagonicus)* 19

Diuca *(Diuca diuca)* 20
Diucón *(Pyrope pyrope)* 21
Dormilona Tontita *(Muscisaxicola maclovianus)* 22

Fío Fío *(Elaenia albiceps)* 23

Garza Chica *(Egretta thula thula)* 24
Garza Cuca *(Ardea cocoi)* 25
Garza Grande *(Ardea alba egretta)* 26
Gaviota Cáhuil *(Chroicocephalus maculipennis)* 27
Gaviota de Franklin *(Leucophaeus pipixcan)* 28
Gaviota Dominicana *(Larus dominicanus)* 29
Gaviota Garuma *(Leucophaeus modestus)* 30
Gaviotín Elegante *(Thalasseus elegans)* 31
Gaviotín Monja *(Larosterna inca)* 32
Golondrina Chilena *(Tachycineta meyeni)* 33
Gorrión *(Passer domesticus)* 34

Huairavo *(Nycticorax nycticorax)* 35

Jilguero *(Spinus barbata)* 36
Jote Cabeza Colorada *(Cathartes aura)* 37
Jote Cabeza Negra *(Coragyps atratus)* 38

Loica *(Sturnella loyca)* 39

Mero *(Agriornis lividus)* 40
Minero *(Geositta cunicularia)* 41

Paloma *(Columba livia)* 42
Pato Cuchara *(Spatula anas platalea)* 43
Pato Jergón Chico *(Anas flavirostris flavirostris)* 44
Pato Jergón Grande *(Anas georgica spinicauda)* 45
Pato Real *(Anas sibilatrix)* 46
Pato Yeco *(Phalacrocorax brasilianus)* 47
Pelícano *(Pelecanus thagus)* 48
Perrito *(Himantopus mexinacus melanurus)* 49
Picaflor Chico *(Sephanoides sephanoides)* 50
Pidén *(Pardirallus sanguinolentus)* 51
Pilpilén *(Haematopus ater)* 52
Piquero *(Sula variegata)* 53
Playero Blanco *(Calidris alba)* 54

Queltehue *(Vanellus chilensis)* 55

Rara *(Phytotoma rara)* 56
Rayador *(Rynchops niger cinerascens)* 57

Tagua *(Fullica armillata)* 58
Tagüita *(Gallinula melanops)* 59
Tenca *(Mimus thenca)* 60
Tijeral *(Leptasthenura aegithaloides)* 61
Tiuque *(Milvago Chimango)* 62
Tordo *(Curaeus curaeus)* 63
Tórtola *(Zenaida auriculata)* 64
Tortolita Cuyana *(Columbina picui)* 65
Trile *(Agelasticus thilius thilius)* 66

Viudita *(Colorhamphus parvirostris)* 67

Zarapito *(Numenius phaeopus hudsonicus)* 68
Zorzal *(Turdus falcklandii)* 69

Flora 70

***A*mancay** *(Alstromeria aurea)* 71
***A*mofila** *(Ammophila arenaria)* 71

Campanilla de las Dunas *(Calystegia soldanella)* 71
Chupalla *(Fascicularia bicolor)* 71
Clonqui *(Ambrosia chamissonis)* 71
Conyza *(Conyza bonariensis)* 72
Cortadera *(Cyperus eragrostis)* 72
Cortadera Enana *(Carex pumila)* 72

Doca *(Carpobrotus chilensis)* 72
Duraznillo *(Persicaria maculosa)* 72

Grama Salada *(Distichlis spicata)* 73

Huilmo Amarillo *(Sisyrinchium striatum)* 73

Litre *(Lithraea caustica)* 73
Lupino Arbóreo *(Lupinus arboreus)* 73

Manzanillón *(Anthemis spp)* 73

Nafalio *(Gamochaeta spp)* 74

Paico *(Dysphania chilense)* 74
Perlilla *(Margyricarpus pinnatus)* 74

Quilloi Quilloi *(Stellaria chilensis)* 74
Quilo *(Muehlenbeckia hastulata)* 74

Retamilla *(Cytisus striatus)* 75
Romerillo *(Baccharis linearis)* 75

Salvia Macho *(Eupatorium salvium)* 75
Suspiro de Mar *(Nolana paradox)* 75

Totora *(Schoenoplectus californicus)* 75

Vira vira *(Pseudognaphalium viravira)* 76

BECACINA

(Gallinago magellanica)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Humedales	Lombrices	Si	Jun - Jul	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Cabo de Hornos

DESCRIPCIÓN

Ave limícola, caradriforme de la familia Scolopacidae, de unos 32 cm de alto, vive y se reproduce en vegas, pantanos y otros humedales.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza parda con líneas claras desde la base del pico hacia la nuca; una sobre y otra bajo el ojo. Espalda variegada con tonos negros, café amarillento y marrón. Cuello y pecho variegados de tonos claros y finos. Flancos blancos con líneas transversales negruzcas. Abdomen blanco. Pico recto, largo (69 mm) de color verdoso oscuro. Patas amarillo verdosas.*

BLANQUILLO

(Podiceps occipitalis occipitalis)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Lagunas	Organismos acuáticos	Sí	Sept - Oct **Zona baja** Dic - Ene **Zona alta**	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave acuática de la familia Podicipedidae, de 28 cm de largo, convive en bandadas de hasta 20 ejemplares, presente de cordillera a costa.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza gris parduzca. Lados del pico y garganta grises. Nuca negra. Plumas auriculares largas y finas café amarillentas. Cuello, pecho y abdomen blancos. Flancos y lados del pecho negruzcos. Dorso gris oscuro. Barra blanca en el ala que se ve al batirla. Pico negro. Patas negras. Ojos rojos.*

CACHUDITO

(Anairetes parulus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Forestal	Insectos y semillas	No	Ago - Ene	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Paposo a Cochrane

DESCRIPCIÓN

Ave paseriforme de la familia Tiránidos, de unos 11 cm de largo, de movimientos rápidos y se mueve en pequeñas bandadas que suelen ser agresivas.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza negra, en la frente y zona auricular, en la nuca hay líneas longitudinales blancas. Dorso gris algo oliváceo. Pecho y abdomen blanquecino con líneas longitudinales negras. Abdomen a veces con tinte amarillento. Alas y cola negruzcas. Barba externa de las rectrices laterales claras. Pico negro. Patas negras. Iris blanco.*

CHERCÁN

(Troglodytes aedon)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Todo lugar	Insectos	No	Sep - Dic **Zona centro** Oct - Ene **Zona sur**	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Caldera a Cabo de Hornos

DESCRIPCIÓN

Pequeña ave paseriforme de la familia Troglodytidae, de unos 12 cm de largo, la más común en el territorio.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza y dorso color canela claro. Garganta, pecho y abdomen blanquecino acanelado. Alas canela algo rojizas con barras oscuras. Flancos y subcaudales canela rufo. Cola parda algo rojiza con barras transversales negruzcas. Pico negruzco. Patas café.*

CHINCOL

(Zonotrichia capensis)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Campo y ciudad	Poca data	No	Todo el año **Zona norte** Jul - Feb **Zona centro** Oct - Feb **Zona sur**	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Islas Guaitecas

DESCRIPCIÓN

Ave paseriforme de la familia Emberizidae, de unos 13 a 15 cm de largo, muy común en nuestro territorio y de hábito arborícola.

DIMORFISMO

SÍ

MACHO: *cabeza gris con copete y 3 líneas negras a cada lado hacia la nuca. Garganta y abdomen blanquecinos. Gran mancha rufa rodea el cuello. Pecho café claro terroso. Manto y lomo pardo con líneas longitudinales negras. Cola parda. Patas y pico córneos.* **HEMBRA:** *tonos más apagados. Sin copete.* **JUVENIL:** *plumas más jaspeadas en el dorso y sin el tono rojizo del cuello. Pecho café claro terroso muy vermiculado longitudinalmente de café oscuro.*

CHIRIHUE

(Sicalis luteola)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Praderas	Semillas y artrópodos	No	Sept - Mar	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Aysén e Islas Guaitecas

DESCRIPCIÓN

Pequeña y vistosa ave paseriforme de la familia Thraupidae, de 14 a 15 cm de largo, abunda en el país y es similar al Jilguero, pero sin tonos negros.

DIMORFISMO

SÍ

MACHO: *cabeza gris verdosa hasta las mejillas; corona, nuca y cuello trasero de igual color con rayas pardas; dorso con rayas gruesas. Lomo y supracaudales amarillo verdoso. Garganta, cuello, pecho superior y flancos amarillo grisáceo. Pecho y abdomen amarillo. Subcaudales blanquecinas. Primarias negruzcas con ribete verdoso en la barba exterior. Cobertoras pardo negruzco con bordes grisáceos; las pequeñas amarillentas. Cola negruzca.* **HEMBRA:** *partes inferiores más grisáceas y menos amarillas que el macho.*

CHORLO CHILENO

(Charadrius modestus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Humedales	Insectos y lombrices	Sí	Oct - Nov	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Llanquihue a Cabo de Hornos (registrada en Arica)

DESCRIPCIÓN

Ave caradriforme de 19 a 22 cm de largo, suele migrar al norte en abril y su plumaje cambia según su estado, la época del año y desarrollo.

DIMORFISMO

NO

PLUMAJE REPRODUCTIVO: *en verano, cabeza con banda blanca y parte superior café ceniza. Pecho rojo castaño y abdomen blanco, separados por una banda negra. Flancos blancos. Primarias negruzcas. Cola negruzca con rectrices externas blancas.* **NO REPRODUCTIVO:** *en invierno, tonos pardos; se pierde la banda negra divisoria del pecho; banda blanca de la cabeza pasa a ser supercilar parda. Mantiene abdomen y garganta blancos. Pecho pardo amarillento.* **JUVENIL:** *plumaje similar al adulto no reproductivo, con plumas moteadas hacia el dorso.*

CHORLO DE COLLAR

(Charadrius collaris)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Sin Vegetación	Insectos y gusanos	Sí	Variable	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Los Lagos

DESCRIPCIÓN

Ave de la familia de los Carádridos, muy parecido al chorlo común a excepción del pecho donde presenta un vistozo collar negro.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *Frente blanca. Corona anterior negra. Corona posterior, nuca y cuello acanelado. Garganta, cuello anterior, pecho y abdomen blancos. Línea fina negra desde el pico a la nuca pasando por el ojo. Línea gruesa negra dividiendo la parte blanca entre el cuello y pecho. Dorso y cubiertas alares café grisáceo con marginaciones acaneladas. Rectrices externas blancas y centrales oscuras. Pico negro. Patas anaranjado-amarillentas.*

CHURRETE COMÚN

(Cinclodes patagonicus chilensis)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Zonas con agua	Invertebrados	No	Sept - Oct Nov **Zona sur**	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Aconcagua a Chiloé y Aysén

DESCRIPCIÓN

Ave paseriforme de la familia de los Furánidos, mide entre 21 y 22 cm de largo, habita en zonas costeras hasta unos 2.000 msnm.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza hasta bajo los ojos parda oscura con ceja ancha y blanca hasta la nuca. Cubiertas alares, manto, lomo y cola parda oscura. Garganta y parte superior del pecho banquecinos con algunas estrías pardas variando a pardo más claro que el lomo en el resto del pecho y abdomen. Rectrices laterales con punta acanelada. Pico oscuro. Patas córneas.*

CISNE COSCOROBA

(Coscoroba coscoroba)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Lagunas	Invertebrados acuáticos	Sí	Oct - Dic	Vulnerable

DISTRIBUCIÓN

Huasco a Cabo de Hornos

DESCRIPCIÓN

Ave anseriforme de la familia Anátidas de 112 cm de largo, presente en lugares con abundante agua, especie única.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *totalmente blanco. Primarias con punta negra. Pico rojo con punta rosada. Patas rosadas. Ojos rojos.*

CISNE DE CUELLO NEGRO

(Cygnus melanocoryphus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Aguas tranquilas	Vegetación	Sí	Oct - Nov	Vulnerable

DISTRIBUCIÓN

Coquimbo a Cabo de Hornos

DESCRIPCIÓN

Inconfundible ave de la familia de las Anátidas de 122 cm de largo, con cuerpo blanco, cabeza y cuello negro, ambos sexos de aspecto igual.

DIMORFISMO
SÍ

APARIENCIA: *totalmente blanco a excepción de la cabeza y los dos tercios superiores del cuello que son negros. Raya blanca bordea los párpados y se extiende hacia atrás hasta la nuca. Mentón blanco. Iris negro; pico color plomo con la base y carúncula rojas. Patas color carne claro.*
MACHO: *es de mayor tamaño y carúncula más desarrollada.*

COLEGIAL

(Lessonia rufa)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Lechos de ríos	Insectos y larvas	Sí	Oct - Ene	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Pequeña ave de la familia de los Tiránidos, de 12 a 13 cm de largo, su nombre se debe a la mancha café en su dorso y que pareciera llevar un maletín.

DIMORFISMO

SÍ

MACHO: *negro con dorso y escapulares castaño rojizo.*
HEMBRA: *partes superiores café tierra, el dorso con mancha rojiza más pálida que la del macho. Partes inferiores gris ceniza. Cola negra.*

COLIBRÍ GIGANTE

(Patagona gigas gigas)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Zonas arbustivas	Néctar e insectos	No	Oct - Ene	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Arauco (visto en Chiloé)

DESCRIPCIÓN

Ave pequeña e inconfundible de 21 a 22 cm de largo, bastante más grande que su pariente Picaflor chico (Sephanoides sephaniodes).

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *dorso color gris verdoso con brillo verde metálico débil. Partes inferiores de color café/rojizo con ribetes verdosos más visibles en la garganta y abdomen. Rectrices café verdoso con brillo verde metálico. Los machos son algo más grandes.*

COMETOCINO PATAGÓNICO

(Phrygilus patagonicus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Laderas y quebradas	Omnívoro	Si	Nov - Feb	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

La Serena a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Pequeña ave paseriforme de la familia Tráupidos, de unos 15 a 16 cm de largo, a menudo en grupos, especialmente en invierno.

DIMORFISMO

SÍ

MACHO: *cabeza, cuello y parte superior del pecho gris azulado oscuro. Lorum negruzco. Dorso amarillo oliváceo con tonos castaños. Lomo amarillento. Pecho y abdomen amarillo verdoso. Subcaudales gris azuloso pálido. Primarias negruzcas. Cobertoras y cola gris azulado oscuro.* **HEMBRA:** *cabeza en tonos azulados oscuros, cobertoras y cola en grisáceo. Dorso verde oliváceo oscuro. Partes inferiores verde amarillento pálido; subcaudales gris pálido.* **JUVENIL:** *similar a la hembra y al Cometocino de Gay (Phrygilus gayi).*

DIUCA

(Diuca diuca)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Campo y ciudad	Semillas y atrópodos	Si	Sept - Feb	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Coquimbo a Magallanes

DESCRIPCIÓN

Ave paseriforme de la familia Tráupidos, de unos 17 a 18 cm de largo, vive entre matorrales y jardines, nativa de América del sur.

DIMORFISMO

NO

MACHO: *cabeza, cuello, dorso y pecho gris apizarrado. Garganta blanca. Bajo pecho y abdomen blancos. Tintes acanelados en el abdomen y subcaudales. Rémiges gris oscuras bordeadas de gris apizarrado con cobertoras grises. Rectrices gris oscuras. Pico y patas oscuras.*

HEMBRA: *el gris es reemplazado en parte por tonos gris acanelado.*

DIUCÓN

(Pyrope pyrope)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Campo y ciudad	Insectos y frutos	Sí	Oct - Ene	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Copiapó a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave paseriforme de la familia de los Tiránidos de unos 21 cm de largo. Conocida popularmente como Huilco o Huelco.

DIMORFISMO
NO

APARIENCIA: *los adultos tienen la cabeza, cuello y dorso gris oscuro. Primarias y secundarias casi negras, cobertoras gris oscuras. Cola gris clara con bordes externos de las rectrices blancos. Garganta y abdomen blanquecino. Pecho gris claro. Pico negro. Patas negras. Ojos rojos.*
JUVENIL: *es de color gris algo parduzco con ojos pardos.*

DORMILONA TONTITA

(Muscisaxicola maclovianus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Valles y costas	Insectos	No	Sept - Mar	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Llanquihue a Cabo de Hornos (migra a Arica en invierno)

DESCRIPCIÓN

Ave paseriforme de la familia de los Tiránidos, de unos 16 cm de largo, su nombre se debe a que suele descansar con la cara al viento y ojos cerrados.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza parda oscura, bridas y auriculares negruzcas. Dorso pardo grisáceo terminando en negruzco. Garganta, pecho y abdomen gris blanquecino. Mentón marrón oscuro. Primarias negras con bordes blancos. Cola negra con bordes externos de las rectrices laterales blanco. Pico negro. Patas negras.*

FÍO FÍO

(Elaenia albiceps)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Bosques y jardines	Omnívoro	Sí	Nov - Ene	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Pequeño cazamoscas de la familia de los Tiránidos, de unos 15 cm de largo, se le llama chiflador por su especial silbido que realiza al vocalizar.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza parda con rayas longitudinales negras. Dorso pardo variegado con rayas negras y blanquecinas. Pecho y abdomen café claro. Primarias negras; barba externa parda y rayas negras. Cobertoras pardas con rayitas negras. Cola café con barritas negras. Pico y patas córneos.*

GARZA CHICA

(Egretta thula thula)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Rios y pantanos	Animalitos acuáticos	Sí	Nov - Dic	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Puerto Montt

DESCRIPCIÓN

Especie de ave pelecaniforme de la familia de los Ardeídos, de unos 50 cm de largo, se aleja hasta 20 km del nido en busca de alimento.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *totalmente blanca. Pico negro con base amarilla. Cuello largo. Piernas largas negras por delante y amarillas por detrás; patas amarillas. Ojos amarillos. Plumas largas en la cabeza, dorso y pecho, más visibles en la época de reproducción.*

GARZA CUCA

(Ardea cocoi)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Rios y pantanos	Animalitos acuáticos	No	Sept - Ene	Riesgo Menor

DISTRIBUCIÓN

Antofagasta a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave de la familia de los Ardeídos, de unos 120 cm de largo, es muy tímida y desconfiada, vive en solitario y construye sus nidos en árboles.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *básicamente es gris a gris azulada. Cabeza y cuello blanquecino. Corona y nuca negras. Pecho negro. Abdomen blanco. Rémiges negruzcas. Pico puntiagudo amarillento.*

GARZA GRANDE

(Ardea alba egretta)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Ríos y lagunas	Animalitos acuáticos	No	Nov - Dic	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave pelecaniforme de la familia de los Ardeídos, de unos 85 cm de largo, solitaria durante el día, al anochecer se reúne a dormir en grupo.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *totalmente blanca. Pico puntiagudo amarillo. Iris amarillo. Piernas largas negras y patas negras.*

GAVIOTA CÁHUIL

(Chroicocephalus maculipennis)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Costas y lagos	Peces e insectos	Sí	Nov - Ene	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave caradriforme de la familia de los Láridos, de unos 42 cm de largo, le gusta habitar lugares con otras aves y son bastante confiadas.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *en época de reproducción presenta la cabeza y garganta pardas oscuras con semicírculo blanco en la parte trasera del ojo. Cuello, pecho y abdomen blancos. Dorso y cobertoras grises. Primarias blancas, algunas con punta negra. Secundarias grises. Superficie alar interna blanca. Pico rojo oscuro. Patas rojas oscuras. Durante la época no reproductiva la cabeza y garganta cambian a blanco, con nuca grisácea y mancha oscura en la zona auricular.*

GAVIOTA DE FRANKLIN

(Leucophaeus pipixcan)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Costas y lagos	Insectos y animalitos	Sí	Otoño e invierno boreal	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Llanquihue

DESCRIPCIÓN

Ave caradriforme de la familia de los Láridos, de unos 36 a 38 cm de largo, con alta presencia en Valdivia, migra hacia Norteamérica en mayo.

DIMORFISMO

NO

VERANO AUSTRAL: *cabeza es grisácea jaspeada de blanco con corona negruzca hasta el ojo; anillo periocular blanco. Manto y cobertoras grises. Cuello y partes inferiores blancas. Primarias externas grises con punta blanca y banda subterminal negra; primarias internas y secundarias grises con punta blanca. Cola blanca. Pico negruzco. Patas cafe rojizas oscuras.* **VERANO BOREAL:** *cabeza negra, círculo periocular blanco, pico rojo oscuro, tonalidad rosada en las partes inferiores.* **JUVENIL:** *presentan partes superiores con tonos parduzcos y en la cola una banda negra.*

GAVIOTA DOMINICANA

(Larus dominicanus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Playas y ríos	Omnívora	No	Nov - Ene	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Cabo de Hornos

DESCRIPCIÓN

Ave caradriforme de la familia de los Láridos mide entre 60 y 62 cm de largo, presente en las costas, es bulliciosa, ágil y algunas veces agresiva.

DIMORFISMO

NO

ADULTO: *cabeza, cuello, pecho, abdomen y cola blancos. Manto y lomo negro pizarra. Parte superior del ala negro pizarra con bordes blancos, parte inferior blanca con primarias negras. Pico amarillo con mancha roja en la mandíbula inferior. Patas gris verdoso claro. Párpados rojos.* **INMADURO:** *plumaje blanco sin manchas; dorso, cobertoras, rémiges y cola negro parduzco. Pico amarillo pálido con punta oscura y mancha roja incipiente en la mandíbula inferior.* **JUVENIL:** *blancos manchados de café, especialmente en el dorso y cobertoras. Rémiges y cola café oscuro. Pico café oscuro.*

GAVIOTA GARUMA

(Leucophaeus modestus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Playas y desierto	Pulgón de mar	Sí	Nov - Ene	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Corral y también vista en Golfo de Penas

DESCRIPCIÓN

Ave caradriforme de la familia de los Láridos, de unos 42 y 44 cm de largo, propia de Sudamérica, solo cría en el desierto de Atacama.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza blanca en verano; y gris parduzca en invierno. Cuerpo gris, más oscuro en las partes superiores. Primarias negras, secundarias grises con punta blanca formando una línea terminal. Cola gris con banda subterminal negruzca. Patas negras. Pico negro.*

GAVIOTÍN ELEGANTE

(Thalasseus elegans)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Zona costera	Pequeños peces	Sí	Abr - May	Casi Amenazada

DISTRIBUCIÓN

Arica a Puerto Montt (visitante de verano)

DESCRIPCIÓN

Ave caradriforme de la familia de los Estérnidos, de unos 40 a 42 cm de largo, se mueve por las costas llegando a México y California, donde nidifica.

DIMORFISMO

NO

VERANO AUSTRAL: *la cabeza es blanca; nuca, moño y banda auricular de color negro moteado de blanco. Dorso, cobertoras y alas gris perla; primarias negruzcas. Lomo, pecho, abdomen y cola blancos; rectrices externas con mancha subterminal negruzca. Pico largo rojo anaranjado. Patas negras, a veces rojas o con manchas rojas.*

VERANO BOREAL: *Durante el verano boreal presenta la frente y corona hasta la línea ocular, nuca y moño negros. Resto de la cabeza blanca.*

GAVIOTÍN MONJA

(Larosterna inca)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Costa rocosa	Anchoveta y peces	No	Todo el año	Casi Amenazada

DISTRIBUCIÓN

Arica a Corral

DESCRIPCIÓN

Ave caradriforme de la familia de los Estérnidos, de unos 41 cm de largo, es confiado y el más llamativo de la corriente de Humboldt.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *color gris apizarrado oscuro, algo más claro en la garganta y subalares. Alas grises; las puntas de las secundarias bordeadas de blanco, formándose una línea de ese color en la mitad del ala cerrada. Cola negra parduzca. Pico rojo con comisura amarilla, sobre asta y bajo el ojo largas plumas blancas hacia atrás y encorvadas hacia abajo. Patas rojas.*

GOLONDRINA CHILENA

(Tachycineta meyeni)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Campo y ciudad	Insectos	Sí	Sept - Dic	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave paseriforme de la familia de los Hirundínidos, de unos13 a 14 cm de largo, distribuida desde la costa a la cordillera y desde bosques abiertos hasta playas.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza, cuello trasero, dorso y lomo de color negro con brillos metálicos azulinos. Garganta, cuello delantero, pecho, abdomen y rabadilla blancos. Alas y cola negras con algo de brillo metálico verdoso. Pico negro pequeño. Patas negras.*

GORRIÓN

(Passer domesticus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Jardines y plazas	Semillas e insectos	No	Sept - Dic	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Todo el territorio continental e insular

DESCRIPCIÓN

Ave paseriforme de la familia de los Pasáridos, de unos 16 cm de largo, es originaria de Europa y Asia, en 1904 fue introducida a Chile como ave exótica.

DIMORFISMO

SÍ

MACHO: *partes superiores pardas, manchadas de castaño y negro; lomo y supracaudales gris pardo. Partes inferiores blanquecina y gris pardo. Mancha negra al centro de la garganta. Alas negruzcas; cobertoras secundarias bordeadas de blanco. Cola oscura bordeada de oliváceo. Pico negro.* **HEMBRA:** *es menos robusta que el macho y parduzca. Sin la mancha negra de la garganta. Banda ocre desde la parte superior del ojo hasta la nuca. Pico pardo.* **JUVENIL:** *similar a la hembra.*

HUAIRAVO

(Nycticorax nycticorax)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Aguas bajas	Animalitos acuáticos	No	Oct - Dic	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave pelecaniforme de la familia de los Ardeídos, de unos 56 a 65 cm de largo, destaca por poseer un cuello mucho más corto que las demás garzas.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza negruzca con azul tornasol. Frente y superciliares blancas. Dos o tres plumas largas blancas que salen desde la cabeza hacia atrás. Dorso y lomo negruzcos con brillos tornasoles azul y verde. Garganta blanca. Pecho y abdomen grisáceo claro y alas grises más oscuras. Pico grueso oscuro. Patas amarillas. Ojos rojos. Los inmaduros son de color pardo, con líneas longitudinales blancas.*

JILGUERO

(Spinus barbata)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Matorrales y arboleda	Semillas	Sí	Sept	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Copiapó a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave paseriforme de la familia de los Fringílidos, de unos 13 a 14 cm de largo, es famosa por su canto y puede domesticarse con facilidad.

DIMORFISMO

SÍ

MACHO: *cabeza amarilla verdosa oscura en la nuca y corona negra. Cuello amarillo verdoso y garganta negra. Dorso amarillo verdoso oscuro rayado de negruzco. Pecho amarillo verdoso y abdomen más blanquecino. Alas con rémiges negras y mancha amarilla en la base de las primarias y secundarias; cobertoras oscuras con punta amarilla formando dos líneas de ese color.*

HEMBRA: *es similar al macho, careciendo de la corona y garganta negras. Partes inferiores menos amarillentas y más verdosas.*



JOTE CABEZA COLORADA

(Cathartes aura)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Costa a precordillera	Carroña	Si	Sept - Oct	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Magallanes

DESCRIPCIÓN

Ave catartiforme de la familia de los Catártidos, de unos 62 a 81 cm de largo, suele planear la mayor parte del día y posee un olfato desarrollado.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cuerpo de color negro parduzco. Cabeza y cuello desnudos, rojos. Cola y alas por debajo gris blanquecino. Pico blanco córneo. Patas grises. Ojos rojos.*
INMADURO: *tiene la punta del pico oscura.*
JUVENIL: *tiene la cabeza parduzca.*



JOTE CABEZA NEGRA

(Coragyps atratus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Tierras bajas	Carroña	Si	Sept - Oct	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Aysén

DESCRIPCIÓN

Ave catartiforme de la familia de los Catártidos, de unos 56 a 74 cm de largo, su vuelo es como un murciélago, aleteos fuertes y rápidos.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *presentan un color general negro con brillo metálico por encima. Cabeza y cuello desnudos. Primarias y secundarias grisáceas a blanquecinas por debajo. Cola corta. Pico negro ganchudo. Patas negras.*

LOICA

(Sturnella loyca)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Zonas con agua	Insectos y frutos	No	Sept - Nov	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Magallanes

DESCRIPCIÓN

Ave paseriforme de la familia de los Ictéridos, mide unos 26 a 28 cm de largo, hay varias leyendas populares sobre ella en la cultura chilena.

DIMORFISMO

SÍ

MACHO: *cabeza y cuello pardo oscuro. Notoria superciliar blanca con rojo hacia la frente. Dorso y cola pardo oscuro variegado con café. Cuello delantero, pecho y parte superior del abdomen rojo vivo. Zona inferior del abdomen parda oscura. Alas café variegada con pardo oscuro. Doblez del ala rojo. Pico pardo oscuro puntiagudo. Patas pardas.* **HEMBRA:** *son como el macho, pero con superciliar, garganta y cuello blanquecino; pecho y abdomen rojo pálido, algunas plumas bordeadas de blanco sucio.*

MERO

(Agriornis lividus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Campos abiertos	Carnívora	No	Oct - Nov	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Copiapó a Valdivia

DESCRIPCIÓN

Ave paseriforme de la familia de los Tiránidos, de unos 27 a 28 cm de largo, se le confunde con el Zorzal, pero el Mero es más robusto.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza, cuello y dorso gris parduzco estriado de negro hacia el centro. Lorums y anillo ocular claro. Garganta blanca con estrías negras vistosas. Pecho pardo claro variando a pardo amarillento hacia el abdomen y las subcaudales rufo claro. Alas negruzcas. Cola negruzca, con borde exterior de la rectriz lateral blanquecina. Pico oscuro con mandíbula superior terminada en gancho. Patas negras.*

MINERO

(Geositta cunicularia)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Dunas y cerros	Insectos y semillas	Si	Sept - Dic	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Llanquihue

DESCRIPCIÓN

Ave paseriforme de la familia de los Furnáridos, mide unos 15 cm de largo, es de hábitos terrestres y suele ser muy caminadora.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *Cabeza parda grisácea, con línea superciliar clara. Por encima pardo grisáceo. Partes inferiores blanquecino leonado con garganta y pecho listado longitudinalmente de oscuro. Alas rufas por encima con ribete negro terminal. Cola acanelada en su base y negruzca hacia el extremo. Pico negro, más claro en su base. Patas córneas.*

PALOMA

(Columba livia)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Campo y ciudad	Omnívora	No	Todo el año	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Todo el territorio continental e insular

DESCRIPCIÓN

Ave culumbiforme de la familia Columbidae, de unos 29 a 37 cm de largo, sus patas no le permiten aferrarse a los árboles y es solitaria.

DIMORFISMO
NO

APARIENCIA: *grises con plumas iridiscentes en el cuello, más vistosas en los machos. Patas rojas. Pico gris oscuro. Iris rojo. Las hay gris con rémiges blancas, gris con cabeza blanca, gris ceniza oscuro; o en donde predomina el rojo-ladrillo (rufas) o completamente blancas con pico rosado, sin embargo, estas son más escasas.*

PATO CUCHARA

(Spatula anas platalea)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Humedales	Plantas acuáticas	No	Sept - Oct	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Coquimbo a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave anseriforme de la familia de las Anátidas, de unos 50 a 51 cm de largo. A diferencia de otros patos, estos son silenciosos.

DIMORFISMO

SÍ

MACHO: *cabeza y cuello rufo claro con algunas rayitas negras en la corona, cuerpo café rufo, claro en la espalda y con manchas negras. Cubiertas alares celestes. Espejuelo verde metálico con banda blanca por delante. Primarias pardo grisáceo. Cola gris oscuro con rectrices externas bordeadas de blanco. Pico negro, grande y ancho. Patas amarillas. Ojo blanco.* **HEMBRA:** *cabeza, manto, partes inferiores, supracaudales y subcaudales café rufo con manchas negras alargadas. Alas como el macho, pero más desteñidas. Ojos café oscuro.*



PATO JERGÓN CHICO

(Anas flavirostris)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Aguas dulces	Semillas y larvas	No	Ago - Feb	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Coquimbo a Canal Beagle

DESCRIPCIÓN

Ave anseriforme de la familia de las Anátidas, de unos 38 a 41 cm de largo, es el pato más pequeño que habita en Chile.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza y cuello pardo claro con muchas líneas transversales finas negras. Manto y escapulares con plumas negras ribeteadas de canela. Supracaudales, subcaudales y cola café grisáceo. Pecho café con leche y pintas ovaladas pardas oscuras, desapareciendo hacia el abdomen. Cobertoras y primarias pardas cenicientas. Espejuelo negro con borde canela hacia adelante y borde blanco hacia atrás. Pluma superior del espejuelo con borde verde metálico. Pico amarillo con punta y línea central negra. Patas amarillentas.*

PATO JERGÓN GRANDE

(Anas georgica spinicauda)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Humedales	Semillas y algas	No	Ago - Feb **Zona norte** Oct - Dic **Zona austral**	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave anseriforme de la familia de las Anátidas, de unos 51 cm de largo, anida entre los pastos y puede llegar a poner entre 4 a 10 huevos.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *este pato presenta la cabeza parda con rayas pequeñas negras. Cuello pardo con pintas negras. Garganta más clara. Manto y lomo con plumas pardas oscuras marginadas de café claro. Pecho y abdomen café claro con pintas negras pequeñas. Vientre blanquecino. Alas pardas con espejuelo negro marginado con café claro. Cola puntiaguda. Pico amarillo con culmen y punta negra. Patas grisáceas.*

PATO REAL

(Mareca sibilatrix)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Lagos y humedales	Herbívora	Sí	Oct - Dic	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Vallenar a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave anseriforme de la familia de las Anátidas, de unos 51 cm de largo, se asocia fácilmente con otras aves acuáticas, se alimenta en los pastizales.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza y cuello negros. Frente y mejillas blancos. Parte posterior de la cabeza con brillos metálicos verdosos. Dorso y escapulares negros con plumas marginadas de blanco. Pecho superior con barras transversales blancas y negras. Pecho inferior y abdomen blanco. Flancos y subcaudales rufos. Alas con primarias negras, subalares grises y mancha blanca. Cola negra. Pico negro. Patas negras.*

PATO YECO

(Phalacrocorax brasilianus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Costas y humedales	Peces y crustáceos	No	Todo el año	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave suliforme de la familia de Phalacrocoracidae, de unos 70 a 75 cm de largo, anida en los árboles, los que se secan por la acidez de sus fecas.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *plumaje totalmente negro brillante. Pico café con punta ganchuda. Piel desnuda amarilla oscura alrededor del pico. Patas negras.*

APAREAMIENTO: *presenta plumas filamentosas blancas a los lados de la cara, garganta y alrededor del pico.*

INMADUROS: *son de color café y con plumaje ventral blanquecino cuanto más jóvenes.*

PELÍCANO

(Pelecanus thagus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Costa e islas	Anchoveta	Sí	Oct - Abr	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Corral, también Chiloé y Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Imponente ave costera de la familia Pelecanidae, de unos 127 cm de largo, posee una bolsa gular debajo del pico para capturar y guardar peces.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza blanca con tonos amarillentos; cuello blanco; base del pico y garganta negros. Pico largo amarillento en su base con lados y punta rojizos. Gran bolsa gular azulosa. Cuerpo oscuro manchado de blanco. Alas oscuras estriadas con blanco. Patas grises.* **APAREAMIENTO:** *poseen cuello trasero negro.* **INMADUROS:** *predominan los tonos parduzcos, cuello café oscuro, abdomen blanquecino, mientras que en los juveniles algo más claros.*

PERRITO

(Himantopus mexinacus melanurus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Humedales	Insectos acuáticos	No	Oct - Feb	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Huasco a Llanquihue

DESCRIPCIÓN

Frágil ave caradriforme de la familia de los Recurvirróstridos, de unos 42 cm de largo, emite un sonido como el de un perro pequeño.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *corona, frente, garganta, pecho, abdomen, flancos y cola blancos. Nuca negra con línea gruesa del mismo color que llega hasta bajo el ojo. Parte posterior del cuello, manto, lomo y alas negras. Pico recto, largo y negro. Patas largas rojas a rosadas. Ojos rojos.*

PICAFLOR CHICO

(Sephanoides sephanoides)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Lugares floridos	Polen y néctar	No	Oct - Nov	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Pequeña ave de la familia Trochilidae, de unos 11 cm de largo, distribuido ampliamente por América del Sur, también llamado picaflor rubí.

DIMORFISMO
SÍ

MACHO: *cabeza verde con corona roja anaranjada iridiscente. Mancha blanca post-ocular. Garganta verde con manchitas bronceadas brillantes. Por encima verde con brillo bronceado. Por debajo verde grisáceo. Flancos y cola verdes bronceados. Pico recto negro.* **HEMBRA:** *son similares al macho, pero presentan la corona sin el brillo rojo; medidas algo menores de alas, cola y pico.*



PIDÉN

(Pardirallus sanguinolentus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Humedales	Insectos y larvas	No	Oct - Ene	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Aysén

DESCRIPCIÓN

Ave gruiforme de la familia de los Rálidos, típica de los humedales, de unos 38 a 40 cm de largo, se le ve con más facilidad en las tardes, de día es escurridiza.

DIMORFISMO
NO

APARIENCIA: *color pardo oliváceo desde la nuca a las cobertoras y cola. Cara, cuello, pecho y abdomen gris ceniciento. Pico largo, algo curvado, con rojo en la base, azulado en el medio y verdoso en el extremo. Patas verdes. Ojos rojos.*
APAREAMIENTO: *sus patas se tornan rojas.*
INMADUROS: *son completamente pardos.*

PILPILÉN

(Haematopus palliatus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Zona costera	Pequeños moluscos	No	Oct - Dic	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Chiloé

DESCRIPCIÓN

Ave costera de la familia de los Hematopódidos, de unos 43 a 44 cm de largo, anidan en la arena de dunas y playas donde sus huevos se mimetizan.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza, cuello y pecho superior negro apizarrado. Dorso, lomo, supracaudales y cobertoras gris parduzco oscuro. Pecho inferior, abdomen, subcaudales, axilares y subalares blanco puro. Cola parda grisácea. Pico recto rojo carmín con punta amarillenta. Patas blanquecinas a rosadas. Ojos amarillos con anillo periocular rojo.*

PIQUERO

(Sula variegata)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Zona costera	Anchoveta y sardina	Sí	Ene - Feb	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Chiloé

DESCRIPCIÓN

Ave costera suliforme de la familia de los Súlidos, de unos 70 a 75 cm de largo, es una de las principales aves guaneras de América del Sur.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza, cuello y manto de color blanco. Partes inferiores blancas. Alas, lomo y cola pardas oscuras moteadas con algo de blanco. Patas gris azulado. Pico azul púrpura con extremidad córnea y en la base siguiendo la línea de la cabeza y cuello.*

PLAYERO BLANCO

(Calidris alba)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Zona costera	Pequeños moluscos	Sí	Ártico alto	Vulnerable

DISTRIBUCIÓN

Arica a Magallanes

DESCRIPCIÓN

Ave costera de la familia de los Escolopácidos, de unos 17 a 20 cm de largo, persigue las olas en busca de cangrejos de arena, enterrados en la zona intermareal.

DIMORFISMO

NO

VERANO AUSTRAL: *corona, nuca, cuello posterior, dorso y supracaudales color gris ceniciento algo parduzco. Frente, garganta, mejillas, cuello anterior, pecho y abdomen blancos. Línea negra al centro de las supracaudales y cola. Cola negruzca. Cobertoras gris parduzco marginadas de blanco. Alas con banda blanca, más notoria al estar extendidas. Pico negro. Patas negras.* **VERANO BOREAL:** *garganta y plumaje pardo rojizo salpicado de blanco y negro. Pecho con manchas pardas, negras y rufas. Resto blanco.*



QUELTEHUE

(Vanellus chilensis)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Praderas y humedales	Insectívora	No	May - Ago	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Copiapó a Chiloé y también en Llanquihue

DESCRIPCIÓN

Ave centinela de la familia de los Carádridos de unos 35 a 37 cm, está siempre muy atenta a cualquier asomo de peligro y tiene un característico grito metálico.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza y cuello grises; frente, garganta y pecho negros; ambos tonos separados por plumas blancas. Dorso gris con brillo parduzco metálico. Cobertoras alares grises con brillos tornasolados. Primarias y secundarias negras separadas de las cobertoras por una banda blanca que se ve con las alas abiertas. Espolón rojizo en el codo de cada ala. Abdomen, flancos y subalares blancos. Cola mitad basal blanca y mitad exterior negra. Pico rojo con punta negra. Patas rojas. Ojos rojos.*



RARA

(Phytotoma rara)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Campo y ciudad	Hierba y fruta	No	Oct - Ene	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Magallanes

DESCRIPCIÓN

Ave rechonca paseriforme de la familia de los Cotíngidos, de unos 19 a 20 cm de largo, su canto es similar a un trino áspero.

DIMORFISMO

SÍ

MACHO: *frente y corona rufa. Cuello trasero, dorso y supracaudales pardo rayado de negro. Garganta, pechó, abdomen y subcaudales rufo acanelado. Alas negruzcas con línea transversal blanca. Cola con rectrices centrales negruzcas. Pico ancho. Ojos rojos.* **HEMBRA:** *por encima pardo grisáceo con rayas longitudinales negruzcas. Garganta acanelada. Pecho y abdomen blanquecino acanelado con rayas finas negruzcas, más notorias en el pecho y flancos. Alas negruzcas sin la franja blanca del macho. Cola igual a la del macho.*

RAYADOR

(Rynchops niger cinerascens)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Costas y ríos	Pequeños peces	Sí	Fuera de Chile	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Estrecho de Magallanes

DESCRIPCIÓN

Ave caradriforme de la familia de los Roncópidos, de unos 40 a 50 cm de largo, forrajea volando la superficie del agua y sumerge su mandíbula inferior por peces.

DIMORFISMO
NO

APARIENCIA: *partes superiores negro ahumado. Partes inferiores blancas. Alas negras, largas y puntiagudas, con bordes de primarias y secundarias blancos; subalares grises con tonos claros a oscuros. Cola oscura. Pico rojo en su mitad basal; resto negro; mandíbula inferior notoriamente más larga que la superior y aplanada verticalmente hacia su extremo. Patas rojas, cortas y pequeñas.*

TAGÜA

(Fullica armillata)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Humedales	Plantas acuáticas	No	Oct - Ene	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Caldera a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave acuática gruiforme de la familia de los Rálidos, de unos 55 cm de largo, es gregaria, territorial y un tanto agresiva cuando se le molesta.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza y cuello negros. Resto del cuerpo negro apizarrado, algo más claro en las partes inferiores. Doblez del ala y borde externo de las primarias blancos. Escudo frontal y pico amarillo con manchas rojas en la unión de ambos. Patas oliváceas con manchas amarillas y franjas rojas en la tibia; dedos lobados grandes. Ojos rojos.*

TAGÜITA

(Gallinula melanops)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Humedales	Plantas acuáticas	No	Oct - Nov	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Llanquihue

DESCRIPCIÓN

Ave acuática gruiforme de la familia de los Rálidos, de unos 29 a 30 cm de largo, suelen ser solitarias, a veces se les ve acompañadas, pero es muy tímida.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza y cuello gris; cara negruzca. Dorso y cubiertas alares pardo a castaño. Flancos pardos con manchitas blancas. Pecho gris variando a blanco hacia el centro del abdomen. Pico y escudo frontal verde amarillento. Patas verde amarillentas. Iris rojo.*

INMADUROS: *presentan tonos parduzcos, más oscuros por encima.*

TENCA

(Mimus thenca)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Bosques y matorrales	Omnívora	No	Sept - Dic	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Copiapó a Puerto Montt

DESCRIPCIÓN

Ave paseriforme de la familia de los Mímidos, de unos 28 a 29 cm de largo, es agresiva, competitiva y territorial, defiende y expulsa de su territorio a otras aves.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cuerpo liviano, de tonos pardos; más oscuro por encima y más claro en la garganta, pecho y abdomen. Superciliar blanca; línea gular parda oscura. Cola larga parda oscura, con plumas centrales de igual color. Las demás terminan en blanco sucio, blanco que se va agrandando hacia las más externas. Pico negro. Patas negras.*

TIJERAL

(Leptasthenura aegithaloides)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Estepa y matorrales	Insectos	Sí	Sept - Dic	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Coquimbo a Aysén

DESCRIPCIÓN

Ave de la familia de los Furnáridos de unos 16 cm de largo, ágil y con frecuencia activo, colgando cabeza abajo en las puntas de las ramas.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *corona y nuca pardo oscura con líneas café claro. Notoria línea superciliar blanca. Garganta, cuello delantero y pecho superior central blanquecinos. Resto del pecho y abdomen café; pálido más amarillento hacia las zonas inferiores. Cuello trasero, dorso y cobertoras café terroso. Alas negruzcas, con borde externo de las primarias y lado basal de las secundarias rufo claro. Cola negruzca con barbas externas delgadas y plumas centrales con barbas delgadas a ambos lados, sobresaliendo unos 2 cm de las siguientes rectrices, lo que da un aspecto de prolongación espinosa.*

TIUQUE

(Milvago chimango)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Campo y ciudad	Insectos y animalitos	No	Sept - Dic	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Concepción (introducido en Rapa Nui)

DESCRIPCIÓN

Ave rapaz diurna de la familia de los Falcónidos, de unos 37 a 40 cm de largo, anida en árboles bajos y sus huevos son de color crema con manchas rojizas.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *manto y lomo con plumas café canela bordeadas blanquecinas. Garganta, pecho, abdomen y vientre café claro. Cabeza café oscura. Alas café oscuro con franja blanquecina en la mitad basal de las primarias. Cola café claro con franja terminal café oscura. Ojos café.*



TORDO

(Curaeus curaeus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Quebradas	Omnívora	No	Oct - Dic	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Estrecho de Magallanes

DESCRIPCIÓN

Ave paseriforme de la familia de los Ictéridos, de unos 28 cm de largo, sus nidos son verdaderas obras de construcción y los huevos son de azul pálido.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *presenta el plumaje completamente negro brillante. Pico y patas negras.*

TÓRTOLA

(Zenaida auriculata)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Valles	Semillas	Si	Oct - Mar	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Iquique a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave de la familia de las Colúmbidas, de unos 26 a 27 cm de largo, en zonas rurales es altamente cazada, por lo que se ha vuelto más desconfiada.

DIMORFISMO

NO

MACHO: *corona y nuca gris parduzcas. Cabeza con tinte vinoso; manchas negras en zona auricular y detrás del ojo. Cuello vinoso con rosado iridiscente. Dorso, lomo y supracaudales gris parduzco. Pecho y abdomen vinosos, más claro hacia las zonas inferiores. Subcaudales blancas. Alas con rémiges gris oscuro, bordeadas de blanco; cobertoras gris pardo y manchas negras. Cola con rectrices centrales gris pardo; resto grisáceas con banda negruzca; las tres laterales con punta blanca y la externa con borde exterior blanco. Pico negro. Patas rosadas.* **HEMBRA:** *más pequeña. Sin gris en la corona, más oscura y parda. Menos plumas iridiscentes en el cuello.*

TORTOLITA CUYANA

(Columbina picui)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Cerros y ciudades	Semillas y granos	No	Sept - Feb	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Malleco y a veces en Valdivia

DESCRIPCIÓN

Ave de la familia de las Colúmbidas, más pequeña que sus familiares, de unos 18 a 19 cm de largo, de arrullo triste e inconfundible.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza de color gris clara, blanquecina hacia los lados de la cara y la garganta. Dorso y lomo gris parduzco. Pecho gris claro algo vinoso, aclarando a blanquecino hacia el abdomen y subcaudales. Alas negruzcas; cobertoras mayores y medianas gris pardas con borde blanco en su barba externa. Cobertoras menores presentan una banda transversal azul metálica fina. Cola gris parda, con las rectrices externas blancas. Pico negro. Patas rosadas.*

TRILE

(Agelasticus thilius thilius)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Pajonales	Insectos y semillas	No	Oct - Dic	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Llanquihue

DESCRIPCIÓN

Ave paseriforme de la familia de los Ictéridos, de unos 19 a 21 cm de largo, se reparte por los juncales de Argentina, Bolivia, Perú, sur de Brasil y Chile.

DIMORFISMO

SÍ

MACHO: *totalmente negro, con codo amarillo notoriamente visible al vuelo.*
HEMBRA: *lomo pardo y variegado de marrón, pecho y abdomen terroso con manchitas oscuras, líneas superciliares claras en la cabeza y cola parda oscura.*
JUVENIL: *similar a la hembra en un tono más amarillento.*

VIUDITA

(Colorhamphus parvirostris)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Arbóreo	Insectos	Sí	Nov - Feb	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Coquimbo a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Pequeña ave paseriforme de la familia de los Tiránidos, de unos 12 a 13 cm de largo, de silbido agudo y melancólico, suele pasar mucho tiempo entre el follaje de los árboles.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza gris parduzca oscura; lados de la cara grisáceos. Dorso, lomo y supracaudales pardo oliváceo. Garganta y pecho grisáceos; abdomen, subcaudales y flancos grisáceos lavados de amarillento. Alas pardo negruzcas con cobertoras ribeteadas de acanelado formando dos barras transversales de ese color. Cola pardo negruzca. Pico negro, corto y fino. Patas negras.*

ZARAPITO

(Numenius phaeopus hudsonicus)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Zonas costeras	Pulgas de mar y larvas	Sí	Verano en la tundra ártica	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Arica a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave de la familia de los Escolopácidos de unos 42 cm de largo, tienen sensores en el pico que les permite detectar cuando hay alimento en el suelo.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *corona parda con línea blanquecina en el centro. Cejas blanquecinas. Cara y cuello moteado fino de pardo y blanquecino. Dorso y cobertoras moteados de pardo y blanquecino. Pecho café claro moteado de oscuro. Abdomen café claro. Alas pardas con algunas manchas claras grandes. Cola con líneas transversales pardas claras y oscuras. Patas grises. Pico largo y curvado hacia abajo. Ojos pardos.*

ZORZAL

(Turdus falcklandii)

HÁBITAT	ALIMENTACIÓN	MIGRATORIA	REPRODUCCIÓN	LISTA ROJA DE UICN
Campo y ciudad	Frutos y lombrices	No	Sept - Oct	Menor Riesgo

DISTRIBUCIÓN

Atacama a Tierra del Fuego

DESCRIPCIÓN

Ave de la familia de los Túrdidos, de unos 29 cm de largo, es interesante ver la destreza con que busca y encuentra las lombrices en la tierra.

DIMORFISMO

NO

APARIENCIA: *cabeza de color café, corona y nuca parda oscura; manto, lomo y cubiertas alares café claro. Garganta parda blanquecina con estrías longitudinales oscuras. Pecho y abdomen pardos blanquecinos algo amarillentos. Primarias, secundarias y cola negruzcas. Pico macizo amarillo. Patas amarillas. Ojos pardos oscuros con párpados amarillos.*

Humedal de Curanipe

FLORA

Región del Maule

por Alex Curi

AMANCAY
(Alstromeria aurea)

- *Hierba perenne*
- *Nativa*
- *Borde ribereño*

por Henrik Larsson

AMOFILA
(Ammophila arenaria)

- *Hierba perenne*
- *Introducida*
- *Duna*

por CAC Peluhue

CAMPANILLA DE LAS DUNAS
(Calystegia soldanella)

- *Hierba perenne*
- *Introducida*
- *Duna*

por CAC Peluhue

CHUPALLA
(Fascicularia bicolor)

- *Hierba epífita perenne*
- *Nativa*
- *Borde ribereño*

por CAC Peluhue

CLONQUI
(Ambrosia chamissonis)

- *Hierba perenne*
- *Introducida*
- *Duna y Marisma*

por CAC Pelluhue

CONYZA
(Conyza bonariensis)

- Hierba anual
- Nativa
- Borde ribereño

por Henrik Larsson

CORTADERA
(Cyperus eragrostis)

- Arbusto
- Nativa
- Marisma y Borde ribereño

por CAC Pelluhue

CORTADERA ENANA
(Carex pumila)

- Hierba perenne
- Introducida
- Duna

por CAC Pelluhue

DOCA
(Carpobrotus chilensis)

- Hierba perenne
- Nativa
- Duna

por Benny Trapp

DURAZNILLO
(Persicaria maculosa)

- Hierba anual
- introducida
- Marisma

GRAMA SALADA
(Distichlis spicata)

- *Hierba perenne y rizomática*
- *Nativa*
- *Duna y Borde ribereño*

HUILMO AMARILLO
(Sisyrinchium striatum)

- *Hierba perenne*
- *Nativa*
- *Borde ribereño*

LITRE
(Lithraea caustica)

- *Árbol*
- *Endémica*
- *Borde ribereño*

LUPINO ARBÓREO
(Lupinus arboreus)

- *Arbusto*
- *Introducida*
- *Duna*

MANZANILLÓN
(Anthemis spp)

- *Hierba anual bienal*
- *Introducida*
- *Marísma*

por Forest Kim Blair

NAFALIO
(Gamochaeta spp)

Hierba anual
Nativa

PAICO
(Dysphania chilense)

Hierba perenne
Nativa
Duna y Marisma

por Alex Rojo

por CAC Pelúhue

PERLILLA
(Margyricarpus pinnatus)

Arbusto
Nativa
Duna

QUILLOI QUILLOI
(Stellaria chilensis)

Hierba perenne
Nativa
Borde ribereño

por CAC Pelúhue

por Hanna Larsen

QUILO
(Muehlenbeckia hastulata)

Arbusto
Nativa
Borde ribereño y marisma

por Franz Xaver

RETAMILLA
(Cytisus striatus)

- Arbusto
- Introducida
- Duna

por Mandón

ROMERILLO
(Baccharis linearis)

- Arbusto perenne
- Introducida
- Borde ribereño

por CAC Peluhue

SALVIA MACHO
(Eupatorium salvium)

- Arbusto
- Endémica
- Borde ribereño

por CAC Peluhue

SUSPIRO DE MAR
(Nolana paradoxa)

- Hierba anual
- Nativa
- Duna

por Curve Clark

TOTORA
(Schoenoplectus californicus)

- Hierba perenne
- Nativa
- Marisma y Borde ribereño

VIRA VIRA

(Pseudognaphalium viravira)

Hierba perenne
Nativa
Borde ribereño

GLOSARIO

Árbol. *Es una planta robusta y fuerte, con tronco leñoso con la capacidad de ramificarse a una distancia considerable del suelo, posee ramas nacientes formando copas, bosques y arboledas.*

Arbusto. *Es una planta leñosa perenne de cierto porte que a diferencia de los árboles, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base, formando matorrales.*

Hierba anual. *Es aquella que crece en exterior durante la época de primavera y verano, y que sobrevive solo a una estación de crecimiento.*

Hierba bienal. *Es aquella que tarda en completar su ciclo biológico de 24 meses, necesita por lo general dos estaciones o períodos vegetativos desde que germina hasta que florece.*

Hierba epífita. *Es una planta que crece sobre otro vegetal u objeto usándolo solamente como soporte, pero que no lo parasita nutricionalmente.*

Hierba perenne. *Es aquella cuyas hojas no se desprenden durante la época desfavorable, suele cambiar su follaje, pero no con la misma frecuencia que las de hoja caduca.*

Hierba rizomática. *Es aquella que genera tallos subterráneos con varias yemas que crecen de forma horizontal con raíces y brotes herbáceos, que funcionan como reservorio de nutrientes.*

Portada. *Huevos de Pilpilén en la arena, ave playera que anida a simple vista en medio de las dunas o las arenas. Fotografía por Sandra González Canales.*

Imágenes con licencia CC que permiten ser usadas en medios y sustratos con fines educativos y no comerciales. Atribuyendo el reconocimiento al autor y expresando que han sido puestas dentro de circunferencias por motivos de diseño siendo esta una modificiación a la imagen principal.

CUIDEMOS NUESTRO HUMEDAL

DATOS DE UTILIDAD QUE AYUDAN AL HUMEDAL DE CURANIPE

Acude a las siguientes organizaciones ante algún eventual caso de contaminación, accidente, fauna en peligro o cualquier duda.

SERNAPESCA

+56 (73) 2970416

Responde a los **varamientos, heridas o peligro de especies protegidas** brindando apoyo profesional especializado a los animales que necesitan ayuda.

VIGILANTE COSTERO

www.vigilantecostero.cl

vigilantecostero@gmail.com

@vigilantecosta

Si observas actividades que **atenten contra este ecosistema** puedes registrarlas, contactar y compartir con Vigilante Costero.

CAC PELLUHUE

cacpelluhue@gmail.com

@vigilantecosta

CAC Pelluhue sustentable

Para **dudas sobre este sendero** contacta al Comité Ambiental Comunal (CAC) Pelluhue.

¿Cómo cuidar nuestro humedal?

NO INGRESAR CON MOTORIZADOS | LLEVA TU BASURA DE REGRESO | NO ENCIENDAS FOGATAS | NO ABRAS SENDEROS | NO ALIMENTES A LOS ANIMALES | NO TRAER PERROS SUELTOS

Proyecto "Mi Vecino Estuario II, Revalorizando el Patrimonio Natural"

Curanipe, Región del Maule, 2021

Proyecto
“Mi Vecino Estuario II, Revalorizando el Patrimonio Natural”

CAC PELLUHUE
CAC Pelluhue

FOTOGRAFÍAS
Sandra González Canales
@fotos_aves_maule

Rodrigo de la O
@vigilantecosta

Diego Villagrán
@freebirds_chile

Cláudio Dias Timm
Avifauna Gaúcha

CAC PELLUHUE
@cacpelluhue

DISEÑO Y DIBUJO
Humberto González Castañeda
@rustungberto

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Rodrigo González Salgado

REGISTRO DE AUDIO
Álvaro Bustamante Medina

GRABADO LÁSER
Entorno Estudios
www.entornoestudios.cl

LÁMINAS GRÁFICAS
El Medio Impreso
@elmedioimpreso

Curanipe, Región del Maule, 2021