



الإمساكية الصرحية
جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة والسكان
رمضان ١٤٤٧ هـ - فبراير ٢٠٢٦ م

صحتك
مبارك

100 مليون صحة




الإصدار الرابع © وزارة الصحة والسكان. فبراير ٢٠٢٦.

يهدف هذا الدليل إلى رفع الوعي الصحي في شهر رمضان، وتعزيز السلوكيات الغذائية السليمة التي تساعد على صيام آمن ومتوازن،

يُسمح باستخدام محتوى هذا الدليل للأغراض التوعوية والصحية غير التجارية فقط، مع عدم تحريف المحتوى أو اقتطاعه بما يخل بمضمونه العلمي، أو استخدامه بما يخالف أهدافه الصحية أو السياسات المعتمدة لـ وزارة الصحة والسكان.

كما يُوصى دائمًا بالرجوع إلى الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إجراء أي تغييرات علاجية أو غذائية، خاصةً لمرضى الأمراض المزمنة، وكبار السن، والحوامل، والأطفال.



جدول المحتويات

الصفحة	العنوان	م.
٧	النظام الغذائي في رمضان	١
١٠	تناول وجبة إفطار صحية	- ١,١
١١	تسحروا فإن في السحور بركة	- ١,٢
١٤	أطعمة يجب الابتعاد عنها	- ١,٣
١٨	توصيات عامة	- ١,٤
	صحتك في رمضان	٢
٢١	نصائح لمرضى السكري في رمضان	- ٢,١
٣٤	نصائح لمرضى القلب في رمضان	- ٢,٢
٣٥	نصائح لمرضى الضغط في رمضان	- ٢,٣
٣٨	نصائح لمرضى الكلى في رمضان	- ٢,٤
٤١	نصائح لمرضى الكبد في رمضان	- ٢,٥
٤٤	نصائح للحامل والمريض في رمضان	- ٢,٦
٤٧	نصائح للتوقف عن التدخين في رمضان	- ٢,٧
٤٩	نصائح للنشاط الرياضي في رمضان	- ٢,٨
٥٠	نصائح لمرضى السيلياك (الداء الباطني) في رمضان	- ٢,٩



كيف نسعد لرمضان صحيح؟



- كل يوم تحدٌ جديد، لنفس
أرقى.. وصحة أفضل





رمضان فرصة مواتية للخلاص من العادل السيئة
والتي تؤثر سلباً على صحتنا وفرصة للتحول للعريدين من
العادل الجيدة والحصول على الفوائد الصحية





النظام الغذائي


نظام غذائي صحي في رمضان



امسح الكود



- يصوم المسلمون الأصحاء البالغون شهر رمضان يومياً من الفجر وحتى غروب الشمس، ويتناولون وجبتين: وجبة الإفطار بعد غروب الشمس، ووجبة السحور قبل الفجر. وهناك أدلة علمية علي ما للصوم من آثار إيجابية علي الصحة.
- ورمضان هو شهر البر والتواصل وتنشط فيه الحياة الاجتماعية بشكل خاص، فالناس إما يستقبلون الأقارب والأصدقاء أو يحلون ضيوفاً عليهم، ويلتفون جميعاً حول موائد الإفطار احتفاء بصومهم.
- ويمتد الصيام طوال ساعات النهار، ويجوز للصائمين تناول الطعام والشراب في ساعات الليل وحتى فجر اليوم التالي. وقد يتذرع علي البعض خلال شهر رمضان ممارسة أي نشاط بدني، فيزيد وزنهم في رمضان. وقد لا يمكن مرضى السكري من التحكم جيداً في حالتهم الصحية إذا كانوا يتبعون عادات غذائية غير صحية.






نَحْرِي النَّلَائِسِ بِوَمَا تَغْزِيهِ صَحِيحَةٌ فِي رَمَضَانَ
هَذِهِ بَعْضُ الْإِرْسَادَاتِ الْبَيِّنَاتِ الَّتِي يُنْصَحُ بِهَا كُلُّ صَائِرٍ
حَتَّى يُنْقَصَ وَزْنُهُ أَوْ يُحَافَظُ عَلَيْهِ وَيُخَفَّضَ مَعْدُولُهُ خَسْطُ
الرَّأْيِ وَالْكُوْلِيسْتِرُولِ، وَيُنْعَجَ بِصَحةٍ جَيِّدةٍ، وَيُسْمَعَ لِأَنْتَرِ
بُوقَنَةٍ فِي الْعِبَادَةِ وَمَعَ الْأَهْلِ وَالْأَصْرَقَاءِ

رمضان
KAREEM
—
RAMADAN



١. بتناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة لتعويض مسيرة الطاقة لريان



تجنب بشكل عام الأطعمة المقلية أو التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر



استمتع بتناول اللحوم الخالية من الدهون والدجاج بدون جلد والأسماك سواء كانت مشوية أو مطبوخة بالفرن للحصول على وجبة جيدة من البروتين الصحي



الإفطار على ثلاث تمرات من الطرق التقليدية والصحية بدء وجبة الإفطار لأن التمر غني بالألياف



تناول في وجبة الإفطار الكثير من الخضروات لتزود جسمك بالفيتامينات والمغذيات، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة لتزود جسمك بالطاقة والألياف




٢. سحر و... فأي في السحور بركة

- السحور وجبة خفيفة، مثل الفطور الخفيف في غير أيام رمضان، ويجب أن تتضمن هذه الوجبة خضراوات وحصة من الكربوهيدرات مثل (الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة)، وأطعمة غنية بالبروتين مثل (منتجات الألبان جبن خفيف الملح / أو بيض)، بالإضافة إلى طبق جانبي من السلطة.
- يجب على هذه الفئات أن تحرص على تناول وجبة السحور:



- كبار السن
- المراهقين
- الحوامل
- المرضعات
- الأطفال الذين يرغبون في الصيام

رمضان كريم



٣. أهمية الماء

- يزداد خطر إصابة الصائم بالجفاف عند حلول شهر رمضان المبارك مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مما يعرض الصائم للتعب والإعياء.
- هناك فئات في المجتمع أكثر عرضة للجفاف من غيرهم هم:
 - الأطفال.
 - المسنون.
 - المصابون بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض الكلى.
 - الأشخاص الذين يبذلون مجهوداً جسدياً، خصوصاً إذا كانوا يتعرضون لأشعة الشمس أثناء قيامهم بالأنشطة الجسمانية.





نصائح ولارشادات من أجل تفادي الإصابة بالجفاف في شهر رمضان




تزداد معدلات تعرق الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة، ولذا من الضروري الحرص خلال شهر رمضان على شرب كمية كبيرة من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور، (لا يقل عن 10 أكواب) لتعويض ما يفقده الجسم أثناء ساعات النهار.

احرص على تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل البطيخ والسلطة الخضراء التي تحتوي على الطماطم والخضار.



تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.



٤. أطعمة يجب الابتعاد عنها في رمضان




الحر من السكريات

الحر من الرهوة



الحر من الملح



الحر من السكريات



-تجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات عقب وجبة الإفطار، حيث تتضمن الحلويات التي يتناولها الناس عادةً في رمضان كميات كبيرة من شراب السكر.



-تناول فاكهة تحتوي على المياه للتحلية مثل البرتقال أو أي فاكهة موسمية أخرى مثل الخوخ بدلاً عن العصائر المحلاة بالسكر الأبيض.



-احذر المشروبات الغازية التي تحتوي على السكر لأنها ستضيف مزيداً من السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي.



الحد من الدهون



- يجب الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون، خاصة اللحوم الغنية بالدهون، والأطعمة المصنوعة من الفطائر المضاف إليها دهون/سمن نباتي أو زبدة.



- من الأفضل الابتعاد عن القلي واستخدام طرق أخرى في الطبخ، مثل استخدام البخار، أو طبخ الطعام بالصلصة، أو القلي السريع باستخدام كمية صغيرة من الزيت، أو باستخدام الفرن.





الحر من الملح




-من الأفضل عند إعداد الوجبات الحد من استخدام الملح بقدر الإمكان، واستخدام الأعشاب المختلفة لتحسين نكهة الأطعمة التي يتم تحضيرها.

-يفضل تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، مثل اللحوم المملحة ومنتجات الأسماك، والزيتون والمخللات، والوجبات السريعة، والأجبان المالحة.



-يفضل استخدام ملح منخفض الصوديوم بدلاً عن الملح العادي.



٥. توصيات عامة



بعض العادات الغذائية الصحية التي تساعد على إنقاص الوزن على إيقاف الوزن في رمضان



-هناك الكثير من العادات الغذائية الجيدة والصحية التي تساعد على إنقاص الوزن في شهر رمضان، ومن الأفضل أن تستمر هذه العادات بعد انتهاءه، ومنها:



- تناول اللحم والدجاج الخالي من الدهون.
- الحد من استعمال الزيوت المهدّجة في إعداد الطعام.
- استخدام الشوي أو السلق في إعداد الوجبات بدلاً من القلي.
- تناول اللحم والدجاج الخالي من الدهون أو المشوي بدون الجلد.
- استبدال الحلويات المليئة بالسكر الأبيض بالفواكه الطازجة.
- استخدام منتجات الحليب قليلة أو خالية الدسم في تحضير الأطعمة الرمضانية.
- استبدال العصائر المحلاة والشراب المركب بالعصائر الطازجة.
- الإكثار من شرب السوائل بين وجبتي الإفطار والسحور.
- تناول الخضروات الطازجة وتقديم السلطات بدون إضافات غنية بالدهون.



-تقليل كمية النشويات بخلط الأرز المطري على البخار بالخضروات أو البقوليات لإعطاء نكهة طيبة ولزيادة كمية الألياف الغذائية في الطبق، مما يؤدي إلى الإحساس بالشبع.



-في الأيام الحارة خلال شهر رمضان، والتي يمتد فيها الصيام لساعات طويلة، من المهم خلال ساعات الظهيرة أن تتوارد في مكان مظلل وجيد التهوية، وأن تتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.



-الإفراط في الطعام يسبب حرقة المعدة والشعور بعدم الارتخاء، فتناول الطعام ببطء بكميات مناسبة لاحتياجاتك واستمتع بوجباتك





-يفضل ممارسة الأنشطة الرياضية المعتادة في فترات المساء بعد الإفطار بثلاث ساعات لتجنب الإجهاد الشديد أو التعرض إلى الجفاف أو انخفاض مستوى الجلوكوز بالدم



صحیح فی رمضان


معلومات صحیحة





١. نصائح لمرضى السكري في رمضان





يشعر كل المصابين بالسكر بالحيرة أصوم أم لا أصوم؟!

تختلف الإجابة تماماً من شخص لآخر، ولكن يظل طبيبك الخاص هو الوحيد قادر على إجابة هذا السؤال حسب نوع السكري المصاب به وتقدير حالتك الصحية حيث يقدم الطبيب المختص التدريب الكامل لصيام آمن مع تعديل بعض جرعات الأدوية.

صيام آمن بدون مشاكل ولا مضاعفات.....






١.١. مخاطر الصيام غير الآمن لمريض السكري

- قد يسبب الصيام لمرضى السكري ثلاثة مخاطر رئيسية وهم ارتفاع وهبوط مستويات السكر في الدم بالإضافة إلى حدوث الجفاف والذي قد يؤثر على وظائف الكلى والأوعية الدموية
- قد يحدث ارتفاع السكر بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي تحدث في رمضان مع قلة شرب الماء خلال ساعات الافطار
- أما الهبوط فقد يحدث بسبب طول عدد ساعات الصيام والتي قد تصل إلى متوسط ١٧ ساعة بالإضافة إلى عدم تعديل أدوية السكر بما قد يتاسب مع الصيام بسبب قلة شرب الماء مع تناول النشويات ذات المؤشر الجلايسيمي العالي مع المخللات والحوادق وكثرة شرب الشاي والقهوة بالإضافة إلى المجهود البدني الزائد أثناء الصيام كل هذا قد يؤدي إلى حدوث الجفاف والذي يؤدي إلى زيادة نسب حدوث مشاكل الكلى والأوعية الدموية وتسبب زيادة في نسب حدوث الجفاف

١.٢. ينقسم مرضي السكري إلى ٣ مجموعات حسب درجة الخطورة


* المجموعة الأولى

- ٠ لا يجب عليها (بتاتاً) صيام رمضان لما فيه من خطورة شديدة مع ضرورة الاستماع لنصيحة الطبيب بعدم الصوم. وتشمل هذه المجموعة:
 - أي مريض سبق له الإصابة بالانخفاض الشديد للسكر في الشهور الثلاثة السابقة لشهر رمضان
 - أي مريض أصيب بارتفاع الأحماض الكيتونية في الدم في الشهور الثلاثة السابقة لشهر رمضان




- أي مريض أصيب بالارتفاع الحاد جدًا للسكر في الدم مع زيادة المعدل الأسموزي في الدم وفيه يكون معدل السكر قد تجاوز ٥٠٠ مجم/دل وذلك في خلال الثلاثة شهور السابقة لرمضان
 - الإصابة المتكررة بانخفاض السكر في الدم
 - فقدان الإحساس بأعراض انخفاض السكر
 - مرضى السكر من النوع الأول غير المنتظمين ويعرف ذلك بارتفاع معدل السكر التراكمي Hb A1C عن ٧٪
 - الإصابة بأي مرض حاد آخر
 - مرضى السكر الحوامل ممن يعالجون بالأنسولين أو منتجات السلفونيليويريا
 - مرضى السكر المصابين بالفشل الكلوي من المرحلة الرابعة والخامسة والمرضى المعالجين بالغسيل الكلوي
 - المرضى المصابين بأمراض الشرايين من المراحل المتقدمة كقصور الشريان التاجي أو جلطات القلب والمخ أو انسداد شرايين الأطراف
 - المرضى من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أخرى
- * المجموعة الثانية:**

- ليست على نفس درجة الخطورة الشديدة، ولكن يجب عليها أيضًا عدم صيام رمضان والاستماع للنصيحة الطبية وتشمل هذه المجموعة:
- مرضى السكر من النوع الثاني وغير المنتظمين ويُعرف ذلك بزيادة معدل السكر التراكمي Hb A1c عن ٧٪.
- مرضى السكر من النوع الأول المنتظمين



- المرضى بسكر الحمل ممن يعالجون بالحمى الغذائية أو الحبوب
 - مرضى الكلى من المرحلة الثالثة
 - مرضى السكر المصابين بأمراض الشرايين المستقرة حالتهم الصحية
 - مرضى بأمراض أخرى بالإضافة لمرض السكر
 - مرضى السكر الذين يقومون بجهود عضلية كبيرة
 - مرضى السكر الذين يتناولون أدوية تؤثر على قدرتهم على التركيز والذاكرة
ووظائف المخ
- * المجموعة الثالثة:**
- يمكنها الصوم بعد مناقشة الطبيب المعالج للتأكد من القدرة على الصوم مع ضرورة سماع النصيحة إذا قرر الطبيب عدم الصوم. وتشمل هذه المجموعة:
 - مرضى السكر من النوع الثاني المنتظمين (نسبة السكر التراكمي أقل من 7%) ومعاجين بالحمى فقط أو بأي من الأدوية التالية:
 - الميتفورمين وبدون تعديل في الجرعة
 - منتجات السلفونيليووريا مع ضرورة تعديل الجرعة عن طريق متخصص في السكر
 - جميع الأدوية الأخرى عن طريق الفم بدون تعديل في الجرعة
 - الأدوية المستخدمة بالحقن غير الإنسولين بدون تعديل في الجرعة
 - فقط الإنسولين طويل المفعول مع الحبوب وبدون إنسولين قصير المفعول مع احتمال تعديل جرعة الإنسولين بمعرفة متخصص في السكر




٣،١. نصائح نحو وجبة إفطار صحية في رمضان

- إبدأ فطارك بكوب أو اثنين من الماء مع تمرة أو اثنين
- حاول ألا تزيد نسبة النشويات في الأكل
- احرص على تناول نسبة جيدة من البروتين الحيواني أو النباتي
- تجنب الإفراط في تناول الدهون
- يجب الإقلال من الحلويات قدر الإمكان وأن تكون على سبيل التذوق ويمكن استبدال الحلويات بثمرة من الفاكهة على أن تكون بعد أداء صلاة التراويح
- يجب الإقلال من شرب الشاي والقهوة والتي تعمل كمدرات للبول قد تؤدي إلى الجفاف

٤،١. نصائح نحو وجبة سحور صحية

- لا تنسى شرب المزيد من الماء في الفترة بين الإفطار والفجر فالجسم يحتاج تقريباً من ٨ إلى ١٠ أكواب كبيرة من الماء
- تأخير السحور قدر الإمكان
- يجب الإقلال من المخللات والحوادق والتي قد تسبب زيادة في العطش
- يمكن استعمال الفول في وجبة السحور يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ولكن استشير طبيبك لمعرفة الكميات المناسبة
- يمكن استعمال الجبن والبيض والزيادي كبدائل مناسبة
- لا تنسى الخضروات والتي تحتوي على ألياف تجعلك فترة أطول بدون جوع



أثناء الصيام

- يفضل عدم شرب الكثير من الشاي والقهوة أثناء وجبة السحور
- لا تنسى أن تفحص مستوى السكر بالدم قبل الفجر أو عقب الاستيقاظ من النوم

١،٥ بعض الإرشادات العامة لصيام أمن «متى يجب قياس السكر في رمضان»


• تتنوع المواعيد التي يجب قياس فيها السكر كالتالي:



- وقت الفجر
- الصباح عند الاستيقاظ
- منتصف اليوم
- قبل الافطار وبعد الافطار بساعتين
- بعد أداء صلاة التراويح
- عند الشعور بالتعب

- تختلف عدد مرات القياس خلال اليوم من شخص لأخر لذا يجب التحدث مع طبيبك عن المواعيد المفضلة للقياس حسب حالتك الطبية

**لا تقلق فقياس السكر أثناء فترة الصيام
لا يفسد الصيام**



عيش مبسط بسكر مضبوط

• يجب على مريض السكري مراجعة الطبيب المختص قبل شهر رمضان ليتأكد من أنه قادر على الصيام في شهر رمضان، وننصحه بالتالي:

- مراجعة جرعات أدوية السكر مع الطبيب المختص خصوصاً بالنسبة للمرضى الذين يتلقون الإنسولين وتعديل مواعيد تلقي العلاج لتناسب مواعيد تناول الوجبات في رمضان

- الإصرار على الصيام رغم تحذيرات الأطباء قد ينتج عنه مضاعفات خطيرة
- في حالة الإحساس بالهبوط لا تنم هذا خطر جداً فقد يكون السكر منخفضاً
ويجب وقف الصوم فوراً بعد التأكد بالقياس من هبوط السكر بالدم
- تناول الدواء بانتظام وفقاً للتعليمات

- لا يجب التعمد في رفع السكر بكثرة الأكل أو وقف العلاج أو النوم طول اليوم
خوفاً من هبوط السكر أثناء الصيام قد يؤدي ذلك لارتفاع في مستوى
السكر في الدم فيجب عليك الافطار بشرب الماء وطلب المشورة الطبية تلافياً
لحدوث حموضة كيتونية

«كيف تتجنب الجفاف أثناء الصيام؟»

- الحفاظ على سكر منضبط طول فترة الصيام
- الإقلال من الأكل ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع كالعصائر والحلويات
خاصة في وجبة السحور
- الإقلال من الحوادق والمخللات خاصة في وجبة السحور



- الإقلال من شرب الشاي والقهوة لما لهما دوراً في إدرار البول

- شرب من ٨ - ١٠ أكواب ماء كبيرة في الفترة بين الافطار و حتى أذان الفجر

«متى يجب كسر الصيام فورا؟»

- إذا شعر المريض بأعراض انخفاض السكر في الدم وكان من الصعب استكمال الصيام

- معدل السكر في أي لحظة أقل من ٧٠ مجم/دل

- معدل السكر في الدم أعلى من ٣٠٠ مجم/دل أثناء فترة الصيام خاصة إذا كان مصحوباً بزيادة عدد مرات التبول

- في حالة انخفاض السكر عن ٩٠ مجم/دل ينصح بتكرار قياس السكر مرات عديدة حتى موعد الافطار مع وقف الصيام فوراً إذا انخفض معدل السكر عن ٧٠ مجم/مل


- في حالة التعرض لغيبوبة نقص السكري، ومن أعراضها:

(شدة الجوع، الشعور بالتعب، الإرهاق، الدوار، الصداع، زغالة العين، رعشة باليدين، زيادة إفراز العرق وزيادة ضربات القلب)






«أعراض انخفاض مستوى السكر بالدم»



- الصداع والرؤية المضطربة.
- شعور بالجوع الشديد.
- الشعور بالضعف أو الدوار والارتباك.
- الخفakan أو الإحساس بضربات القلب السريعة.
- الرجفان أو الارتعاش.
- الخمول والتعرق الزائد.
- الرغبة في التقيؤ.

«أعراض ارتفاع مستوى السكر بالدم»

- العطش الزائد: شعور بالجفاف في الفم وال الحاجة المتزايدة لشرب الماء.
- التبول المتكرر: زيادة التبول بشكل غير عادي، خاصةً ليلاً.
- الجوع المستمر: الشعور بالجوع بشكل مستمر على الرغم من تناول الطعام بانتظام.
- فقدان الوزن غير المبرر: فقدان الوزن دون محاولة لإنقاص الوزن.
- التعب والإرهاق: الشعور بالتعب والإرهاق دون سبب واضح.
- العصبية: الشعور بالتتوتر والاضطراب العصبي.
- الرؤية المضطربة: ضبابية الرؤية أو رؤية غير واضحة.
- التئام الجروح البطيء: الجروح تستغرق وقتاً طويلاً للشفاء.
- اضطرابات جلدية: ارتفاع السكر قد يؤدي إلى ظهور حكة، جفاف الجلد.



الأوربة مرضي السكري في رمضان



الوصيات الواردة عامة ولا تشكل توصية طبية
في حال حدوث اي تغيير، يرجى استشارة الطبيب المختص

• تتعدد طرق وأساليب علاج مرضي السكر ما بين مرضي يعالجون بالأنسولين وأخرون يعالجون بحقن خارج مجموعة الأنسولين وأيضاً يعالج بعض المرضى عن طريق الأقراص والكمبسولات وتختلف نوعية العلاج المستخدم وجرعاته باختلاف الحالة ودرجة المرض ويقوم الطبيب المتخصص بتحديد نوعية العلاج والجرعة المطلوبة لكل حالة على حدى.


أولاً مجموعة علاج السكر بالأنسولين تنقسم إلى ثلاث مجموعات:

١. الأنسولين القاعدي (طويل المفعول)

- يستخدم جرعة واحدة تؤخذ مع الافطار مع تقليل الجرعة من ١٥٪ - ٣٠٪ على حسب الحالة بعد استشارة الطبيب المختص.

٢. الأنسولين سريع المفعول(الرائق)

- تؤخذ الجرعة الأولى كاملة مع الافطار (نفس جرعة الغداء قبل رمضان)
- الجرعة الثانية (جرعة السحور) جرعة العشاء قبل رمضان يفضل تخفيضها بعد استشارة الطبيب المختص
- الجرعة الثالثة (جرعة الافطار قبل رمضان) يتم الغاؤها



٣. الانسولين المخلوط(العكر)

- إذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة، فتؤخذ عند الافطار إذا كان المريض يأخذ جرعتين، فيأخذ نفس الجرعة عند الافطار مع تخفيف جرعة السحور من ١٥-٣٠٪ بعد استشارة الطبيب المختص.

ثانياً مجموعة علاج السكر بالحقن غير مجموعة الانسولين (البيتايدات الشبيهة بالجلوكاجون) (GLP1-Agonist)

- تؤخذ نفس الجرعة كما كان قبل رمضان

ثالثاً مجموعة علاج السكر بالأقراص والكبسولات تنقسم إلى عدة مجموعات ذكر منها:

١. بيوجوانيدي (ميتفورمن)

- نفس الجرعة

٢. سالفونييليلوريما

- (جي لميبرايدي - جليكلازيد)


- تقلل الجرعة في حالة إذا كان السكر مضبوط بواسطه الطبيب المختص

- (الجي ليبيين كلاميدي)

- يفضل تغيير هذا النوع من خلال الطبيب المختص تجنباً لحدوث نوبات انخفاض السكر في الدم

٣. سيماجلوتايد

- نفس الجرعة قبل الفطار




٤. مثبطات ثنائي ببتيديل ببتيداز-4 أو جليبيتاز (DDP4 INHIBITOR)
- (فيلاجليبيتين- سيتاجليبيتين- ساكساجليبيتين- ألوجلبيتين- ليناغلبيتين)
- نفس الجرعة

٥. مجموعة ثيازوليدينديون (بيوجليتيرون)
- نفس الجرعة

٦. مثبطات SGLT2 (داباغليفلوزين - أمباغليفلوزين)

- تؤخذ نفس الجرعة، ولكن ينصح بشرب كميات مياه كافية تجنباً لحدوث جفاف
- احرص على مراجعة الطبيب المختص او الصيدلي لتعديل الجرعات الخاصة بأدوية السكري أثناء الصيام





٢. نصائح لمرضى القلب (أثناء الصيام) شهر رمضان

- الجفاف شائع أثناء الصيام ويمكن أن يتعرض المرضى الذين يعانون من أمراض القلب وقصور الأوعية الدموية لأنخفاض ضغط الدم المرتبط بالصيام
- استشر طبيبك للتأكد من قدرتك على الصيام أو لتعديل جرعات الأدوية المناسبة ساعات الصيام
- يجب ضبط الجرعات بشكل دقيق خاصة الأدوية المانعة للتجلط ومثبطات الصفائح الدموية
- نوصي المرضى الذين يعانون من أمراض قلبية خطيرة بالتحدث إلى الطبيب قبل شهر رمضان، خاصة إذا كانت لديهم أعراض تشمل آلام في الصدر ودوخة وإغماء وضيق في التنفس». «تشمل الحالات الخطرة الأخرى قصور القلب، والمرضى الذين خضعوا مؤخراً لعملية قلب مفتوح أو أصيبوا بنوبة قلبية، وارتفاع ضغط الدم الرئوي






٣. نصائح لمرضى الضغط في رمضان

خطوات للحفاظ على صحتك في رمضان


• يجب مراجعة الطبيب قبل شهر رمضان المبارك لتحديد قدرة المريض على الصيام واجراء تعديلات في جرعات ومواعيد الدواء لتلائم السحور والافطار أو الاعتماد على أدوية الضغط ذات المفعول الطويل المدى، حيث تستخدم مرة واحدة أو مرتين كحد أقصى خلال اليوم، والتي يمكن تناولها مساءً ولا تتعارض مع الصيام



- الإقلاع عن التدخين
- اتباع نظام غذائي جيد
- تقليل استهلاك الملح
- الحرص ممارسة الرياضة
- قياس ضغط الدم بانتظام
- الحرص على الحصول على وزن مثالي
- كن على علم بالعلامات التحذيرية من ارتفاع ضغط الدم
- الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء
- الابتعاد عن الاطعمة الغنية بالصوديوم مثل المكسرات المملحة والمخللات، لأنها قد تؤدي لارتفاع الضغط، ويمكن الاستعاضة عنها بتناول السلطة الخضراء الطازجة



- ٠ احرص على ممارسة الرياضة لأنها قد تساهم في التحكم بضغط الدم، وتشير الدراسات إلى أن المحافظة على النشاط البدني، يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع
- ٠ تجنب الأطعمة والسوائل التي تحوي على مادة الكافيين مثل: القهوة، المشروبات الغازية
- ٠ إذا نسي المريض تناول حبوب الضغط في نفس اليوم، فعليه أخذها فور تذكرها، أما إذا تذكر المريض الدواء في اليوم التالي فعليه لا يضاعف الجرعة
- ٠ يعتبر رمضان فرصة حقيقة لإنقاص الوزن بشكل تدريجي، هذا وتشير الدراسات إلى أن تخفيض الوزن، حتى بنسبة بسيطة تصل إلى ٥٪ من الوزن، قد تساعد في إعادة ضغط الدم في رمضان إلى الوضع الطبيعي
- ٠ الانتباه لعلامات الإنذار، مثل الشعور بالدوخة أو الصداع، وضرورة مراجعة الطوارئ فوراً أو الطبيب عند حدوثها. يستطيع المصاب بارتفاع ضغط الدم إذا كان مدخناً أن يعتبر شهر رمضان فرصة ذهبية
- ٠ للإقلاع عن التدخين، مع العلم بأن التدخين يرفع ضغط الدم الانقباضي بمقدار ٢٠ مل زئبق على الأقل، كما وأنه يزيد احتمالات الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية بشكل ملحوظ
- ٠ إذا انخفض الضغط فجأة وبشدة أثناء الصيام أو شعرت بدوار، فيجب الإفطار واستشارة الطبيب فوراً، كما يجب على المريض القيام بقياس ضغط الدم باستمرار خلال اليوم
- ٠ إذا ارتفع ضغط الدم إلى ما يزيد عن ١٤٠ / ٩٠ ملليمتر زئبقي فيجب متابعة



العلاج مع طبيب واستشارته بشأن ارتفاع ضغط الدم وصيام رمضان

- إذا ارتفع ضغط الدم عما يزيد عن ١٨٠/١٢٠ ملليمتر زئبقي فيجب الإفطار فوراً والتوجه إلى الطوارئ على الفور
- يجب مراجعة الطبيب المختص لتحديد الدواء والجرعات المناسبة لكل مريض في شهر رمضان




- انتبه هناك بعض أدوية الضغط التي تؤخذ على معدة فارغة
- المرضى المصابين بانخفاض ضغط الدم عليهم تناول كميات كافية من السوائل لتجنب هبوط الضغط لديهم
- ينبغي على مرضى الضغط الإقلال من شراب عرق السوس

مددرات البول

- يفضل أخذ مددرات البول بعد التراويف وذلك لتجنب الإحساس بالدوار، كما لا يفضل تناول مددرات البول قبل النوم لأنها بطيئتها لن تدع المريض ينعم بنوم هادئ.





٤. نصائح لمرضى الكلى في رمضان

• عند تقرير الصوم من عدمه يصنف مرضى الكلى إلى ثلاثة أقسام بحسب درجة المرض حرصاً على سلامتهم من حدوث مضاعفات.

- **مرضى القصور الكلوى الحاد** تكون حالتهم الصحية حرجة، وهم ممنوعين


من الصيام إلى أن تتحسن حالة الكلى وتعود إلى وضعها الطبيعي

- **مرضى الكلى المزمن** فتختلف مراحل اعتلال الكلى لديهم، وينصح المصابين بمرض الكلى من الدرجة الثالثة فما فوق فوق بعدم الصيام، وذلك لأن الكلى في هذه المرحلة تكون غير قادرة على الاحتفاظ بسوائل الجسم، مما قد يتسبب في قصور حاد في وظائفها، وقد يؤدي ذلك إلى تلف الكلى بشكل كبير، كما أن الصيام لمدة طويلة ينقص سوائل الجسم بصورة كبيرة، ويجب على المرضى الرجوع للطبيب المعالج لمعرفة مدى إصابة الكلى وتأثير الصيام عليهما

- **مرضى الغسيل الدموي** فهم يقومون بغسيل الدم ثلاثة أيام في الأسبوع، وبالتالي فيمكنهم الصيام في باقي أيام الأسبوع؛ حيث يصاحب عملية الغسيل إعطاء محاليل عن طريق الوريد مما يفسد الصيام

- **مرضى الغسيل الروتوبي** (غسيل البطن) التي يقوم بها المريض بنفسه في المنزل فلا يمكنهم الصيام لوجود مواد مغذية بسوائل الغسيل.

- وبالنسبة لمرضى الغسيل الدموي في حالة صيامهم يجب عليهم الحذر من



كمية الماء التي يتناولونها بعد الافطار بحيث لا تزيد عن لتر واحد يومياً حتى لا تجمع المياه داخل الجسم على القلب والرئتين، ولكن مرضى الغسيل البروتوني فمن الممكن أن يتناولوا لترين من الماء يومياً على حسب كمية السوائل التي تخرج مع محلول المستخدم في عملية الغسيل.

- وينصح مرضى زراعة الكلى بعدم الصوم، بسبب تأثير الكلى المزروعة بقلة السوائل ولأنه يتبعن عليهم أخذ الأدوية بصورة منتظمة وفي أوقات محددة، وكذلك فإن أكثر مرضى الزراعة مصابون بمرض السكري، وهذا يزيد من خطورة الصيام على المريض، لذا يجب عليه استشارة طبيبه المعالج بصورة مستمرة.
- لضمان صيام آمن لمرضى الكلى؛ يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة لمرضى الكلى، فعلى مريض الكلى بشكل عام الحرص على تنوع طعامه اليومي وتوازنه وعدم إهمال وجبة السحور حتى لا يضعف جسمه. فمرضى الكلى بحاجة إلى سعرات حرارية أكثر من الأشخاص العاديين، ويجب الحرص على عدم ارتفاع الأملاح لديهم مع الإقلال من الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور خاصة خلال رمضان؛ فالصوديوم متواجد بنسبة كبيرة في ملح الطعام، والبوتاسيوم في بعض الخضروات مثل (الطماطم، البطاطس، البامية، وجميع الأوراق الخضراء) وبعض الفواكه مثل (الموز، البرتقال، المانجو، التمر، المشمش والخوخ والبطيخ الأصفر «الشمام»)، أما الفوسفور فيوجد في البقوليات، والمشروبات الغازية، والمكسرات والحليب ومشتقاته، ويجب على المرضى الذين يتناولون الحبوب التي تعمل على تخفيض مستوى الفوسفور بالدم



أخذها أثناء الوجبة وليس قبلها أو بعدها.

- لكل مرض من أمراض الكلى أسلوب التغذية الخاص به خلال رمضان؛ فمرضى القصور الكلوي في مرحلة ما قبل الغسيل إذا سمح الطبيب المعالج لهم بالصيام فعليهم التقليل من تناول الأغذية الغنية بالبروتينات؛ حيث يسبب الإسراف في تناولها جهداً زائداً على الكلية وتهدم إلى فشل الكلية نهائياً، كما يؤدي إلى زيادة المواد السامة الناتجة عن هضم البروتينات (اليوريا) بالجسم، على عكس مرضى الغسيل الكلوي فهم بحاجة إلى زيادة البروتينات خاصة الحيوانية، فعند عملية الغسيل تخرج بعض البروتينات الأساسية التي يجب تعويضها بالأغذية.

- يتبعن على المريض تناول سوائل طبيعية في مرحلة ما قبل الغسيل الكلوي من ٢ إلى ٣ لتر يومياً إذا كانت كمية البول لديه طبيعية، أما إذا كان البول لديه أقل من المعدل الطبيعي فعليه تقليل كمية السوائل منعاً لاحتباس المزيد من السوائل في جسمه مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات على القلب والرئتين.

- كما يجب على مرضى الكلى بشكل عام عدم التعرض لدرجات الحرارة العالية أثناء الصيام، وتجنب تناول الأطعمة المالحة، واستخدام كأس لشرب الماء حتى لا تزيد كمية السوائل عن المطلوب، كما يجب التقليل من تناول الحلويات مع الحرص على تناول الأطعمة قليلة الدهون؛ فمرضى الكلى لديهم فرص أكبر للإصابة بأمراض القلب والشرايين.

- ومن المهم البقاء على تواصل دائم مع اختصاصي التغذية حتى يظل المريض على دراية بالأطعمة التي يمكنه تناولها مما يقلل من حدوث مضاعفات المحتملة.




٥. نصائح لمرضى الكبد في رمضان

- المشاكل التي تصيب الكبد متعددة وبدورها تحكم في قدرة المريض على صيام شهر رمضان من عدمها، فمنها مشاكل تمنع الصيام تماماً وأخرى تسمح بالصيام بشروط، وثالثة لا مشكلة من الصيام معها.
- بعد مرور ٨ ساعات يتم التخلص من مخزون الطعام الذي تناوله الشخص على السحور، وال الطبيعي أن الكبد يقوم بالاستعانة بالجليكوجين المخزن في الكبد طوال العام، وتحويله إلى جلوكوز للحفاظ على مستوى السكر في الدم، وبالتالي يحافظ على توازن الجسم خلال ساعات الصيام لكن الوضع يختلف من حالة لأخرى.

تليف الكبد

- مع التليف يكون المخزون لدى المريض أقل من الطبيعي، فهنا يجهد الكبد، وبعد مرور ٨ ساعات يدخل المريض في حالة من التعب والإعياء، لذا يفضل عدم صيام مريض تليف الكبد، خاصة إذا كان التليف غير متكافئ أي ظهرت معه مضاعفات، كالاستسقاء أو الدخول في غيبوبة.

- إذا صمم المريض على الصيام فيجب خضوعه للفحص أولاً، فإذا كان التليف لديه متكافئاً، أي دون وجود أي مضاعفات، هنا يمكنه الصيام



بشرط المتابعة والمداومة على الأدوية لضمان عدم تعرضه لأي مضاعفات وتحول التلief من متكافئ لغير متكافئ.

- وعلى مريض التلief الحصول على وجبة سحور تحتوي على نشويات معقدة، كالبليلة، البطاطا، البطاطس لاحتوائهما على سكر معقد يتم تحويله إلى جلوكوز يحافظ على مستوى السكر في الدم، وبالتالي يتجنب المريض لإجهاض الكبد.


- كما يفضل اعتماده على وجبات غذائية متوازنة، تحتوي على كربوهيدرات معقدة لـتغذية الكبد، وبروتين، ودهون غير مشبعة بنسبة ١٥٪، مع الحرص على وجود ألياف، وفيتامينات، ومعادن، كذلك الموجودة في طبق السلطة الخضراء، والامتناع تماماً عن الحلويات الشرقية التي تحتوي على الدهون المشبعة والسكريات البسيطة.

- عند شعور المريض بدوخة، وزغالة، تعرق، عدم تركيز، عليه كسر صيامه والافطار فوراً

- مريض الكبد المصاب بتلief غير متكافئ (خلل بوظائف الكبد) يفضل له الافطار حرصاً على تناول العقاقير المطلوبة في مواعيد منتظمة وتجنبها للجفاف والاجهاد

التهابات الكبد

- مرضى التهابات الكبد المزمنة الفيروسية والدوائية والمناعية ذوى الحالات المستقرة يمكنهم الصيام مع الالتزام بالأدوية مع تعديل مواعيدها، لتلائم ساعات الصيام بعد استشارة الطبيب المعالج.




- أما من الاحتياطات الالزمة لهم على سفرة الافطار أو السحور، فيفضل وضع ملح الطعام منخفض الصوديوم بدلاً عن ملح الطعام العادي، وينصح دائمًا بتناول الكربوهيدرات المعقدة المفيدة للكبد، للحفاظ على مستوى السكر في الجسم.


دهون الكبد

- من يعانون وجود دهون على الكبد هم أكثر المستفيدين من الصيام، لأنه يساعدهم في تخفيف الدهون الموجودة على الكبد لديهم، وتكون فرصة لإنقاص وزنهم الزائد، والتخلص من مخزون الدهون الضارة بشرط الحفاظ على نظام غذائي متوازن، يحتوي على كل العناصر الغذائية بالنسبة الطبيعية، ٦٥٪ من الكربوهيدرات المعقدة، ٢٠٪ من البروتينات، ١٥٪ من الدهون، مع الاعتماد على الفيتامينات والمعادن الموجودة في السلطة الخضراء، والفاكه.

- ويُحذر تماماً من تناول السكريات، خاصة الحلويات الشرقية التي تحتوي على السكر الأبيض والدهون المشبعة



رمضان كريم




٦. نصائح للحامل والمرضع في شهر رمضان

- ينصح الحوامل والمرضعات اللاتي لا يجدن لديهن القدرة على الصيام أو يخشين أن يؤثر الصيام سلباً على حملهن أو أطفالهن الرضع، باستشارة طبيب مختص وإجراء فحوصات طبية عامة قبل اتخاذ قرار صيام شهر رمضان، علمًا بأن الشريعة الإسلامية تبيح للحامل والمرضع الافطار في رمضان في بعض الحالات.
- على الحامل أخذ قسط كافي من الراحة خلال صيامها في نهار رمضان، والحرص على تناول كميات كافية من الطعام الصحي وشرب ثلاث ليترات من الماء بين الافطار والسحور، وتجنب العادات الغذائية السيئة التي يكثر اتباعها خلال شهر رمضان مثل تناول الوجبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.
- قد يؤثر الصيام على نمو الجنين في رحم الأم وقد تكون هناك علاقة بين الصيام والمخاض المبكر لدى السيدة الحامل، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن بعض الأطفال يولدون في وقت مبكر بسبب صيام الأم الحامل، وفي السنوات التي يتزامن فيها شهر رمضان مع فصل الصيف فذلك يعني أن النهار يكون طويلاً وحاراً مما يعرض الحامل لمخاطر الجفاف خاصة مع النقص في السوائل التي تتناولها الحامل ما قد يؤدي إلى المخاض والولادة المبكرة.

الخطة الرمضانية للحامل لصيام أيام

- يُنصح بشرب الماء من ١٠ إلى ١٢ كوب ماء
- لا ينصح بشرب كميات كبيرة من الماء عند





السحور، فالشرب المفرط قد يسبب ألم البطن والتقيؤ

- ينبغي التقليل من استهلاك الكافيين والثيوفيليدين التي تتواجد في القهوة،

والشاي العادي، والكاكاو، والمشروبات الغازية

- يفضل أن تتجنبي المشروبات المحلاة أو المالحة.

من المستحسن ألا تصوم النساء في بداية فترة الحمل خاصةً في الحالات الآتية:

- الحوامل اللواتي يعانيين من التقيؤ ويفقدن الكثير من السوائل، وذلك لمنع حدوث الجفاف.

- الحوامل اللواتي يعانيين من هبوط ضغط الدم الطبيعي في الحمل والذي يؤدي للشعور بالوهن والتعب، فإن الصيام يزيد من هذه الأعراض.


- النساء الحوامل عرضة لأن يصبن بالإغماء خلال الصوم، وقد يصبن بشعور عام سيء أكثر من غيرهن من النساء.

- أما بالنسبة إلى الثلث الثاني من الحمل فقد بينت الدراسات أن الحمل يستهلك كمية مضاعفة من الطاقة وأن الصيام في هذه المرحلة قد يزيد فرصة حصول الولادة المبكرة، علمًا بأن الدراسات قد أظهرت أن صيام النساء الحوامل في الثلث الأخير من الحمل قد لا يؤثر على مؤشرات نمو الجنين.

حالات الحمل الخطيرة

• يُنصح عدم صيام الحامل في رمضان عادةً إذا كانت من المعرضات لخطر كبير، مثل:


- اللواتي يعانيين من مضاعفات الحمل، مثل: داء السكري، أو ارتفاع ضغط الدم



- النساء اللواتي يعانين من المخاض المبكر في الحمل الحالي، أو عانيمن منه في حمل سابق خلال الصوم
- النساء اللواتي يتناولن أدوية ضرورية بعدة أوقات في النهار، ولا نقصد تناول الفيتامينات والحديد التي يمكن أخذها بعد الافطار
- قم بالالتزام بقرار طبيبك في حال قرر بأنه يتوجب عليك الامتناع عن الصيام فعليك الالتزام بالتعليمات



رمضان
کریم



٧. رمضان فرصة مناسبة للإقلاع عن التدخين





- يساهم شهر رمضان الكريم كثيراً في التخلي عن العادات السيئة واتباع نمط العيش الصحي، فالصيام يفرض الانقطاع عن التدخين فضلاً عن الطعام والشراب لفترة طويلة من اليوم، مما يشكل خير فرصة للمدخنين للإقلاع عن التدخين.

- بالإضافة إلى العديد من النشاطات التي يقوم بها الصائم بعد الافطار من زيارات عائلية وصلاة، والتي تشغل الإنسان عن التدخين وتساعده على الإقلاع نهائياً عن هذه العادة الضارة من خلال التخفيف بشكل كبير منها.

- ويعود الإقلاع عن التدخين بمنافع عديدة لاسيما على مرضى السكري؛ إذ يؤدي إلى تحسن في معدلات السكر في الدم والدورة الدموية، ويزيد من استجابتهم للعلاج بالأنسولين، ويخفف من المضاعفات الناتجة عن مرض السكري، كما يخفض مستوى ضغط الدم والكوليسترول، وهذه العوامل جميعها تساعد المريض على التحكم بمرض السكري والعيش بشكل أفضل.

- تحتوي السجائر على أكثر من ٤٥ مادة كيميائية سامة مسببة للسرطان، كما يؤدي استنشاق أول أكسيد الكربون والقطران إلى الإصابة بأمراض سرطان الرئة وأمراض القلب والجلطات وأمراض الجهاز التنفسي.

- ولا شك أن الإقلاع عن التدخين ليس مهمة سهلة وهو يتطلب إرادة وتصميماً قوياً، ولهذا يوصي الخبراء الراغبين بالإقلاع عن التدخين باللجوء لطلب المساعدة من المتخصصين



- نصائح ساحرة على الإفلادع عن التدخين:

- ممارسة الرياضية
- شرب كمية وفيرة من الماء بعد الافطار
- الابتعاد عن المدخنين، إذ أن العديد ممن يريدون الإقلاع عن التدخين، يصعب عليهم ذلك؛ بسبب مخالطتهم للمدخنين مما يزيد من رغبتهم في التدخين
- تجنب الجلوس في مقاهي الشيشة، لأن استنشاق الدخان غير المباشر يعد سبباً لآلاف من حالات الوفاة المرتبطة بأمراض القلب كل عام

الخير
Ramadan
Alkhayer





٨. النشاط البدني في رمضان

متى يمكن للصائم ممارسة النشاط البدني قبل الافطار أم بعده؟
قبل الافطار


- يجب توخي الحذر من ممارسة الرياضة قبل الافطار، وإتباع التعليمات الواجبة لذلك، فممارسة الرياضة يجب أن تكون مقننة قبل وقت الافطار مباشرة ويفضل أن تكون في مكان جيد التهوية، وبعد الافطار يجب تناول كميات مناسبة من السوائل والماء لتعويض ما فقد من الماء والأملاح المعدنية وأخذ قسط جيد من النوم.

بعد الافطار

- من المستحسن ممارسة النشاط البدني بعد الافطار بثلاث ساعات، حتى يكون الجسم قد أتم عملية الهضم وينصح بممارسة التمارين في مكان جيد التهوية

نصائح وإرشادات لممارسة الرياضة في رمضان

- ممارسة النشاط البدني على الأقل ٣٠ دقيقة يومياً في مكان جيد التهوية
- تجنب ممارسة التمارين الرياضية العنيفة والشديدة في نهار رمضان وخاصة في الجو الحار، فالجو الحار يزيد من فقدان جسم الإنسان للسوائل مما قد يؤدي إلى إصابة الصائم بالجفاف



٩. نصائح لمرضى السيلياك (الداء البطني)

مرض السيلياك (الداء البطني) هو اضطراب مناعي ذاتي يحدث عند تناول الجلوتين، مما يؤدي إلى تلف بطانة الأمعاء الدقيقة وسوء امتصاص العناصر الغذائية. العلاج الوحيد المعتمد هو الالتزام التام بنظام غذائي خالي من الجلوتين مدى الحياة.

خلال شهر رمضان، يحتاج مريض السيلياك إلى تحديد غذائي دقيق لتجنب التعرض للجلوتين والحفاظ على التوازن الغذائي.

لالأضطلاع على دليل التغذية العلاجية لمرضى السيلياك امسح الكود التالي.



امسح الكود

- استشارة الطبيب قبل الصيام

- خاصة في حال:

- فقدان وزن غير مبرر


- أنيميا شديدة

- أعراض نشطة (إسهال، انتفاخ شديد)

الترطيب مهم

- متى لا يُنصح بالصيام؟

- في حالات السيلياك غير المستقرأ أو وجود مضاعفات مثل سوء الامتصاص الشديد، يُفضل تأجيل الصيام حتى استقرار الحالة حسب التوصيات الطبية.



رمضان
يفرحنا