

Agrokoncernas pataria

2025 04 11



PASĖLIŲ BŪKLĖ IR ARTIMIAUSI DARBAI

2025 04 11

Meteorologinės sąlygos

Balandžio mėnesio pirmas dešimtadienis yra labai kontrastingas oro sąlygomis. Sulaukėme šiek tiek lietaus, o vietomis iškrito ir sniegas. Dienomis vidutinė oro temperatūra pakildavo iki 5–9 °C, o naktimis vyravo šalnos nuo -2 iki -7 °C. Dirvos temperatūra 10–20 cm gylyje daugelyje šalies rajonų nesiekia 4,5 °C, dirvos drėgmė 10–20 cm gylyje svyruoja nuo 17,5 iki 38,4 proc.

Pasėlių būklė

Daugiau kaip 7 dienas vyravęs labai šaltas, vėjuotas oras su krituliais sniego pavidalu bei šalnomis pristabdė ne tik pavasarinius darbus laukuose, bet ir žieminių augalų augimą bei jų vystymąsi. Žieminių kviečių augalų augimo tarpsnis išlieka BBCH 29–30 ir tik kai kuriuose rajonuose ankstyvos sėjos žieminių kviečių pasėliuose augalai siekia bamblėjimo tarpsnio pradžią (BBCH 30–31). Žieminių miežių pasėlių augalai siekia bamblėjimo tarpsnio pradžią (BBCH 30–31).

Žieminių rapsų pasėliuose augalai yra stiebo ilgėjimo tarpsnyje (BBCH 33–37). Silpnėsiuose žieminių rapsų pasėliuose fiksuojama stiebo ilgėjimo tarpsnio pradžia (BBCH 31–33). Užsitęsios šalnos labiau pakenkė žieminių rapsų augalams, o ypač tiems, kurie buvo pradėję intensyviai stiebtis į viršų. Vykstant augalų aktyviai vegetacijai, augalai labai stipriai reaguoja ne tik į pavasarinės šalnos, bet ir į dienos ar nakties oro temperatūros svyravimus. Taip pat augalai patyrė stiprų „stresą“, jei buvo purkšti augalų maitinimo ar augalų apsaugos priemonėmis likus 1 parai iki šalnos ar praėjus 1 parai po šalnos.



Tinkama augalų auginimo technologija – augalai stipresni ir mažiau pakenkti stresinių situacijų

Nuo kitos savaitės prognozuojamas ženklus oro sąlygų pasikeitimas – „grįžta“ šiluma, o dirvoje dar esant pakankamam drėgmės kiekiui, situacija laukuose sparčiai keisis kiekvieną dieną. Rekomenduojame vertinti kiekvieną pasėlį atskirai ir atlikti augalų maitinimo, augalų apsaugos bei augalų „streso“ mažinimo sprendimus.

Žieminių kviečių tręšimas

Iki šios dienos atlikę žieminių javų augalų biometrinius įvertinimus, matome, kad augalų šaknys yra labiau apkibusios dirvožemiu, palyginus su augalų vertinimu prieš 2 savaites. Augalai intensyviai maitinasi išbertomis pirmosiomis azotinėmis trąšomis. **Bamblėjimo tarpsnio pradžioje (BBCH 30) rekomenduojame atlikti antrą tręšimą azotinėmis trąšomis – amonio sulfatu 120–150 kg ha⁻¹.** Taip pat atlikti maitinamuosius purškimus per lapus panaudojant Agroplus technologijos sprendimus.

Žieminiuose kviečiuose rekomenduojame naudoti (BBCH 30–32):

- **Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha⁻¹ + Agrotop No. 1 Pro 1,0 l ha⁻¹ + Agrotop Javams Pro 0,8 l ha⁻¹ + Agroplus Siera 1,0 l ha⁻¹ + BlueN™ 0,33 kg ha⁻¹**

BlueN™ – mikrobiologinis biostimuliatorius, ypač efektyvus bamblėjimo tarpsnio pradžioje, intensyvaus augalų augimo metu.

Verta padidinti amino rūgščių kiekį, kad augalai greičiau atsigautų po praėjusių šalnų. Todėl rekomenduojame panaudoti **Agroplus Aktiv 80 Pro 0,4 kg ha⁻¹.**

Vėlyvesnės sėjos sparčiam žieminių javų augalų augimui bei atsparesniam ligų ir stresinių situacijų mažinimui rekomenduojame papildomai naudoti **Agroplus Outrun 1,0 l ha⁻¹.** Tai stipriu augimą stimuliuojančiu poveikiu pasižyminti makro-, mikroelementinė trąša, savo sudėtyje turinti ir jūros dumblių ekstrakto.

Biospektrum WG – mikrobiologinis biostimuliatorius, kurio sudėtyje gausus kiekis bakterijų, mikorizinių grybų bei organinių medžiagų. Šis produktas padeda paversti pagrindinius cheminius elementus į formą, kurią lengviau pasisavina augalai. Mikoriziniai grybai padeda augalo šaknims įsisavinti sunkiau prieinamas mineralines medžiagas. Ne ką mažiau yra svarbus mikorizinių grybų gebėjimas sudaryti grybienos barjerą, kuris stabdo patogenų plitimą, stimuliuoja hormonų sintezę bei gerina dirvos struktūrą. Biospektrum WG ne tik skatina augalų augimą, didina jų atsparumą ligoms ir stresinėms situacijoms, bet ir gerina dirvožemio mikrobiologinį aktyvumą.

Žieminių kviečių ankstyvajame bamblėjimo tarpsnyje, kuomet tarp augalų eilučių matomas dirvos paviršius, rekomenduojame papildomai panaudoti **Biospektrum WG 0,25 kg ha⁻¹,** atliekant maitinamuosius ar augalų apsaugos produktų purškimus.



Šiuo metu žieminių kviečių augalai daug intensyviau maitinasi, nei prieš 2 savaites („AgrolTC“, 2025 04 09)

Augalų apsaugos produktų sprendimai žieminiuose javuose

Apie augalų augimo reguliavimo ir piktžolių kontrolės sprendimus plačiau aprašėme naujienlaiškio pirmajame numeryje. ►

Efektyviausias - pirmas augalų augimo reguliavimo sprendimas, kurį turime priimti žieminių javų augalams pradėjus auginti stiebą (BBCH 29–31):

Stabilan® 750 SL 0,5–1,0 l ha⁻¹ + Medax® Top 0,5 l ha⁻¹ + Turbo 0,5 kg ha⁻¹

Apsaugai nuo piktžolių žieminių kviečių pasėliuose rekomenduojame panaudoti herbicidus. Tam, kad atsirinktumėm geriausią piktžolių kontrolės sprendimą – turime įsivertinti pasėlių būklę ir lauke esamų piktžolių botaninę sudėtį.

Kai pasėlyje gausu vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių, ypač rugiagėlių, usnių, kibiųjų lipikų ir raudonžiedžių notrelių:

- **Tombo™ + Trolten™ – 1 vnt. 10–13 ha**

Kai pasėlyje yra vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių, o po derliaus nuėmimo planuojama auginti pupinius ar kaupiamuosius augalus:

- **Timeline® FX + Trimmer® 500 WG – 1 vnt. 13–16 ha (šį produktų mišinį galima naudoti iki BBCH 37)**

Kai pasėlyje gausu tik dviskilčių piktžolių:

- **Quelex™ 0,037 kg ha⁻¹/ Nuance® 75 WG 0,010 kg ha⁻¹ + Agroswap 0,20 l ha⁻¹**

Pasėliams, purkštiems nuo piktžolių rudenį, arba kuriuose vyrauja siauresnės botaninės sudėties dviskiltės piktžolės:

- **Primus® 0,1 l ha⁻¹ + Nuance® 75 WG 0,010 kg ha⁻¹ + Agroswap 0,20 l ha⁻¹**

Kai pasėlyje gausu daržinės žliugės ir įtariama, kad galimai išsivystęs atsparumas ALS inhibitoriams:

- **Spitfire 333 HL 0,36 l ha⁻¹**



Ypač svarbi piktžolių kontrolė žieminių kviečių pasėliuose, kuomet herbicidų panaudojimo sprendimai nebuvo atlikti rudenį

Ligų kontrolė žieminiuose miežuose

Ant sparčiai augančių žieminių miežių augalų naujų lapų vizualiai matomi rinchosporiozės, ramularijos, miltligės ir rudųjų rūdžių pažeidimai. Taip pat ant augalų lapų yra fiziologinių dėmių. Šios dėmės nėra priskiriamos grybinėms ligoms. Tai augalo reakcija į patiriamas stresines situacijas. Žieminių miežių apsaugai nuo grybinių ligų rekomenduojame panaudoti fungicidus, nelaukiant kol augalai pasieks BBCH 32 augimo tarpsnį.

Rekomenduojame pirmam purškimui nuo ligų (BBCH 31 augimo tarpsniu) panaudoti fungicidą Priaxor® 0,5–0,75 l ha⁻¹ + Bolt® 250 0,5 l ha⁻¹



Grybinių ligų infekcija ant augalų lapų žieminiuose miežuose („AgroITC“, 2025 04 09)

Žieminių rapsų tręšimas per lapus

Intensyvaus žieminių rapsų stiebo ilgėjimo tarpsniu (BBCH 30–37) rekomenduojame atlikti tręšimą per lapus.

Jei atlikti dirvožemio tyrimai, dirva turtinga magniu:

- **Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha⁻¹ + Agroplus Extra Mo-B 1,0 l ha⁻¹ + Agroplus Rapsams 0,6 l ha⁻¹ + Agroplus Super KS 1,0 l ha⁻¹ + BlueN™ 0,33 kg ha⁻¹**

Jei atlikti dirvožemio tyrimai, dirva mažai turinti magnio:

- **Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha⁻¹ + Agroplus Extra Mo-B 1,0 l ha⁻¹ + Agroplus Rapsams 0,6 l ha⁻¹ + Agroplus Mg+S 1,0 l ha⁻¹ + BlueN™ 0,33 kg ha⁻¹**

Žieminių rapsų augalams pasiekus butonizacijos tarpsnį (BBCH 51–53) rekomenduojame atlikti tręšimą per lapus:

- **Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha⁻¹ + Agroplus Extra Mo-B 1,0 l ha⁻¹ + Agroplus Rapsams 0,6 l ha⁻¹ + Agroplus Super KS 1,0 l ha⁻¹ + Agroplus Outrun 0,33 kg ha⁻¹**

Šiuo metu žieminiai rapsai auga ir vystosi bei patiria „stresą“ dėl vyraujančių oro sąlygų, todėl rekomenduojame ateinančią savaitę darant purškimus papildomai naudoti Agroplus Outrun 1,0 l ha⁻¹ (BBCH 30–37).

Tręšimą per lapus galima derinti su insekticidų ir fungicidų-augimo reguliatorių purškimais. Esant kietam vandeniui, rekomenduojame naudoti vandens pH ir kietumo korektorių **pH AntiBor 0,4–0,6 l ha⁻¹**.

Kenkėjų kontrolė žieminiuose rapsuose

Pirmaisiais kenkėjų kontrolės sprendimais sunaikinome didelį kiekį rapsų kenkėjų – kopūstinių stiebinių ir rapsinių stiebinių paslėptastraublių bei rapsinių žiedinukų. Pravartu prisiminti, kad kenkėjai migruoja ir vietoj vieno į žieminių rapsų pasėlius atskrenda vis nauji vabalai. Vėsesniu periodu, kenkėjai slepiasi po dirvos grumsteliais ar po augalų lapais ir nėra aktyvūs. Sugrįžus šilumai ir saulėtiems orams šių kenkėjų plitimas ir migracijos aktyvumas bus didelis, todėl reikia nuosekliai stebėti pasėlius, pasiekus kenkėjų žalingumo ribas panaudoti insekticidus.

Žieminių rapsų stiebo ilgėjimo tarpsniu rekomenduojame naudoti:

- **Mavrik® 0,2 l ha⁻¹**

Žieminių rapsų butonizacijos tarpsniu rekomenduojame naudoti:

- **Mospilan 20 SG 0,2 kg ha⁻¹ + Silwet Gold 0,1 l ha⁻¹**

VASARINIAI KVIEČIAI

Ankstyvos ir vidutinės sėjos vasarinių kviečių augalai jau sudygę. Dirvožemyje, esant pakankamam kiekiui drėgmės atsargų ir vyraujant aukštesnei nei 10 °C dirvos temperatūrai, augalai sparčiai augs ir vystysis. Lapų vystymosi ir krūmijimosi tarpsnio metu (BBCH 13–21) rekomenduojame atlikti pirmąjį maitinamąjį purškimą ir paskatinti augalus krūmytis, panaudojant augalų augimo reguliatorius, tuo pačiu apsaugant augalus ir nuo piktžolių.

Lapų vystymosi ir krūmijimosi tarpsnio metu (BBCH 13–21) rekomenduojame naudoti:

- **Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha⁻¹ + Agrotop No. 1 Pro 1,0 l ha⁻¹ + Agrotop Javams Pro 0,7 l ha⁻¹ + Agroplus Super KS 1,0 l ha⁻¹ + Stabilan® 750 SL 1,0 l ha⁻¹**

Atsižvelgiant į piktžolių kiekį, jų įvairovę bei piktžolių dydį, vasarinių kviečių pasėliuose rekomenduojame naudoti:

- **Primus® / Nuance® 75 WG 0,08 vnt. ha⁻¹ + AgroSwap 0,2 l ha⁻¹**

Atliekant herbicidinį purškimą vėliau, siūlome naudoti produktą, kuris naikina ir vienaskiltes piktžoles, tokias kaip tuščiosios avižos ar dirvinės smilguolės.

Rekomenduojame naudoti:

- **Tombo™ 0,15 kg ha⁻¹ + Trolten™ 0,4 l ha⁻¹.**
Šiam mišiniui papildomų paviršiaus aktyviųjų medžiagų nereikia arba
- **Timeline® FX 1,25 l ha⁻¹ + Trimmer® 500 WG 0,0125 kg ha⁻¹**

Vasariniuose kviečiuose, ankstyvuojų daigų tarpsniu, rekomenduojame papildomai panaudoti **Biospektrum WG 0,25 kg ha⁻¹**, atliekant maitinamuosius ar augalų apsaugos produktų purškimus. Vasarinių kviečių šaknų sistema yra silpnesnė, o viršutinis dirvos sluoksnis dažnai būna sausesnis intensyviu augimo laikotarpiu, todėl produkte esantys mikoriziniai grybai padeda šaknims pasiimti maisto medžiagas iš gilesnių sluoksnių. Produkte esančios bakterijos, išskirdamos fermentus, atpalaiduoja dirvožemyje esantį fosforą, kalį ir tirpina silikatinus mineralus, taip atpalaiduodamos silicį. Biospektrum WG taip pat yra bakterijų, atsakingų už atmosferinio azoto fiksavimą.

VASARINIAI MIEŽIAI

Vasarinių miežių, kaip ir vasarinių kviečių augaluose, lapų vystymosi tarpsniu (BBCH 10–21) augalai pradės krūmytis, todėl pasėliuose reikės atlikti pirmuosius maitinamuosius purškimus per lapus. Primename, jog atliekant maitinamuosius purškimus, dalį mineralinių medžiagų įsisavina ir piktžolės. Tai dar labiau paskatina jų augimą, todėl būtina iš anksto planuoti herbicidų purškimo darbus.

Lapų vystymosi ir krūmijimosi tarpsnio metu (BBCH 13–21) rekomenduojame naudoti:

- **Agroplus Aktiv 80 Pro 0,2 kg ha⁻¹ + Agrotop No. 1 Pro 1,0 l ha⁻¹ + Agrotop Javams Pro 0,7 l ha⁻¹ + Agroplus Super KS 1,0 l ha⁻¹**

Atsižvelgiant į piktžolių kiekį, jų įvairovę bei piktžolių dydį, vasarinių miežių pasėliuose rekomenduojame naudoti:

- **Primus® / Nuance® 75 WG 0,085 vnt. ha⁻¹ + AgroSwap 0,2 l ha⁻¹**

Atliekant herbicidinį purškimą vėliau, rekomenduojame naudoti produktų mišinį:

- **Timeline® FX 1,2 l ha⁻¹ + Trimmer® 50 SG 0,012 kg ha⁻¹.**

Pasitelkę šiuos produktus naikinsime platų spektrą vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių.

Su herbicidų mišiniu rekomenduojame naudoti BlueN™ 0,33 kg ha⁻¹. Produktas ypač efektyvus, kai augalai intensyviai auga, o produkte esančios bakterijos sugeba pasisavinti azotą iš oro ir perduoti augalams.

Rekomenduojame vasariniuose miežiuose, ankstyvuojų daigų tarpsniu, papildomai panaudoti **Biospektrum WG 0,25 kg ha⁻¹**, atliekant maitinamuosius ar augalų apsaugos produktų purškimus.

Kenkėjų apsauga vasariniuose javuose

Jaunus vasarinių kviečių ir vasarinių miežių augalų lapus gali pažeisti javinės spragės, todėl pravartu nuolat ir atidžiai stebėti pasėlius. Pastebėjus šių kenkėjų pažeidimus augaluose, rekomenduojame naudoti šiuos insekticidus:

- **Nexide® CS 0,05 l ha⁻¹**
arba
- **Delmetros 100 SC 0,05 l ha⁻¹**

Sėjamieji žirniai ir lauko pupos

Svarbu atlikti pirmuosius purškimo darbus ir pupinių augalų pasėliuose po sėjos. Piktžolės auga ir vystosi kur kas sparčiau nei lauko augalai, tokiu būdu juos stelbdamos ir sudarydamos didelę konkurenciją dėl vietos, šviesos, vandens ir mineralinių medžiagų. Augalus efektyviai apsaugoti nuo piktžolių verta dar ankstyvaisiais augimo tarpsniais (kol piktžolės dar mažos). Vėlinant herbicidų purškimo darbus, produktų efektyvumas, apsaugant augalus nuo piktžolių, mažėja.

Apsaugai nuo piktžolių rekomenduojame naudoti:

- **Stomp® CS 1,5–2,0 l ha⁻¹**
arba
- **Fenix® 600 SC 3,0 l ha⁻¹**

Šie produktai naudojami pasėliuose prieš augalų sudyginimą (BBCH 00–09). Šiuo metu drėgmės kiekis dirvoje yra pakankamas, todėl herbicidai efektyviai veiks prieš plačialapes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles. Svarbu paminėti šių dviejų produktų skirtumą, dėl jų skirtingos produkto formos – **Stomp® CS** (kapsulinė suspensija, geresnis paskleidimas veikliosios medžiagos) ir **Fenix® 600 SC** (koncentruota suspensija, mažesnis tolygumas ir paskleidimas veiklios medžiagos).

Esant nepalankioms sąlygoms, šių dviejų herbicidų efektyvumas nuo piktžolių skiriasi dėl pačių produktų formų.

Pupiniams augalams esant lapų vystymosi tarpsnyje (BBCH 14–15) naujai sudygnusios ar likusios piktžolės naikinamos purškiant **Corum® 1,0 l ha⁻¹ + Dash 1,0 l ha⁻¹**.

Kenkėjų apsauga pupiniuose augaluose



Jaunus sėjamųjų žirnių ir lauko pupų lapus labai dažnai pažeidžia sitonai. Šie kenkėjai ypatingai žalingi augalų dygimo ir lapų vystymosi tarpsniais. Gausiai išplitus sitonams, jie apgraužia ne tik lapus, bet ir augimo kūgelius. Norint, kad jauni pupiniai augalai būtų sveiki ir stiprūs, pravartu atidžiai stebėti pasėlius, o aptikus pirmuosius sitonų pažeidimus, panaudoti insekticidus.

Apsaugai nuo sitonų rekomenduojame naudoti Mavrik® 0,2 l ha⁻¹.

Esant kietam vandeniui ar atliekant purškimus kartu su insekticidu, privalu naudoti vandens pH ir kietumo korektorių **Agrohelf pH 0,2–0,4 l ha⁻¹**.

Žieminių kviečių ARTIST auginimo technologijos. Priešsėlis - rapsai, pupiniai augalai

Šios technologijos yra tinkamos ir kitoms aukšto derlingumo veislėms, pasižyminčioms didesniu jautrumu lapų septoriozei

N	180	P ₂ O ₅	63	LABAI AUKŠTO POTENCIALO TECHNOLOGIJA		VIDUTINIO-AUKŠTO POTENCIALO TECHNOLOGIJA		ŽEMO-VIDUTINIO POTENCIALO TECHNOLOGIJA	
K ₂ O	68	S	29						
PAVASARIS									
									
		25-29				Amonio salietra (N 34,4) 200 kg			
1 PURŠKIMAS		30	Agroplus Aktiv 80 Pro	0,20 kg	Agroplus Aktiv 80 Pro	0,20 kg	Agroplus Aktiv 80 Pro	0,20 kg	
			Agrotop No. 1 Pro	1,00 l	Agrotop No. 1 Pro	1,00 l	Agrotop No. 1 Pro	1,00 l	
			Agroplus Javams	0,60 l	Agroplus Javams	0,40 l	Agroplus Javams	0,40 l	
			Agroplus Siera	1,00 l	Agroplus Siera	0,50 l	Agroplus Siera	0,50 l	
			Stabilan® 750 SL	1,00 l	Stabilan® 750 SL	0,50 l	Stabilan® 750 SL	1,00 l	
			Medax® Top	0,50 l	Medax® Top	0,50 l			
			Turbo	0,50 kg	Turbo	0,50 kg			
						Amonio sulfatas makro PL 120 kg			
2 PURŠKIMAS		31	Timeline® FX	1,30 l	Tombo™	0,20 kg	Tombo™	0,20 kg	
			Trimmer® 500 WG	0,016 kg	Trolten™	0,50 l	Trolten™	0,50 l	
3 PURŠKIMAS		31-32	Agroplus Aktiv 80 Pro	0,20 kg	Agroplus Aktiv 80 Pro	0,20 kg	Agroplus Aktiv 80 Pro	0,20 kg	
			Agroplus Javams	0,60 l	Agroplus Javams	0,40 l	Agroplus Javams	0,40 l	
			Agroplus Siera	1,00 l	Agroplus Siera	0,50 l	Agroplus Siera	0,50 l	
			Nexa 500 EC	0,20 l	Nexa 500 EC	0,20 l	Nexa 500 EC	0,20 l	
			Revystar® XL	0,50 l	Revystar® XL	0,40 l	Revystar® XL	0,40 l	
			Priaxor®	0,50 l	Priaxor®	0,40 l	Priaxor®	0,40 l	
						Amonio salietra (N 34,4) 200 kg			

Žieminių rapsų auginimo technologija

N		183	P ₂ O ₅		88	LABAI AUKŠTO POTENCIALO TECHNOLOGIJA									
K ₂ O		95	S		72										
Pavasarij, temperatūrai pasiekus 8 laipsnius															
1 PURŠKIMAS				Cythrin 500 AgroSwap		0,05 l 0,20 l		3 PURŠKIMAS				Agroplus Aktiv 80 Pro Agrotop Boras Agroplus Rapsams pH AntiBor Agroplus Super KS Mospilan 20 SG AgroHelp Silicon		0,20 kg 1,00 l 1,00 l 0,40 l 1,00 l 0,20 l 0,10 l	
2 PURŠKIMAS				Amonio salietra (N34,4) 320 kg Amonio sulfatas makro PI 300 kg				55-59							
				Agroplus Aktiv 80 Pro Agroplus Extra Mo-B Agroplus Rapsams pH AntiBor Agroplus Super KS Juventus® 90 Mavrik® AgroHelp Silicon		0,20 kg 1,00 l 1,00 l 0,40 l 1,00 l 0,70 l 0,20 l 0,10 l									

- Trąšos, skirtos tręsimui per lapus
- Augimo reguliatoriai
- Birios trąšos
- Herbicidai
- Insekticidai
- Fungicidai
- Paviršiaus aktyviosios medžiagos
- Dirvožemio gerinimas

Vasarinių kviečių auginimo technologijos

N	140	P ₂ O ₅	27	LABAI AUKŠTO POTENCIALO TECHNOLOGIJA		ŽEMO-VIDUTINIO POTENCIALO TECHNOLOGIJA	
K ₂ O	36	S	21				
1 PURŠKIMAS				Agroplus Aktiv 80 Pro 0,20 kg Agrotop No. 1 Pro 1,00 l Agroplus Javams 0,50 l Stabilan® 750 SL 1,00 l		Agroplus Aktiv 80 Pro 0,20 kg Agrotop No. 1 Pro 1,00 l Stabilan® 750 SL 1,00 l Primus/Nuance 75WG 0,08 vnt. AgroSwap 0,20 l	
		13-21					
2 PURŠKIMAS				Tombo™ 0,15 kg Trolten™ 0,40 l			
		30-31					

Vasarinių miežių auginimo technologijos

N	88	P ₂ O ₅	32	LABAI AUKŠTO POTENCIALO TECHNOLOGIJA		VIDUTINIO-AUKŠTO POTENCIALO TECHNOLOGIJA		ŽEMO-VIDUTINIO POTENCIALO TECHNOLOGIJA	
K ₂ O	42	S	25						
1 PURŠKIMAS	 13-21							Agroplus Aktiv 80 Pro 0,20 kg Agrotop javams pro 0,50 l	
2 PURŠKIMAS	 29-30			Agroplus Aktiv 80 Pro 0,20 kg Agrotop javams pro 0,70 l Agroplus Siera 0,50 l Medax® Top 0,60 l Turbo 0,60 kg	Agroplus Aktiv 80 Pro 0,33 kg Agrotop javams pro 0,70 l Agroplus Siera 0,50 l Syrex™ 0,50 l Nexa 500 EC 0,25 l				

Būtina atsižvelgti į pasėlių piktžolėtumą

Pupinių augalų auginimo technologija

N	39	P ₂ O ₅	48	LABAI AUKŠTO POTENCIALO TECHNOLOGIJA	
K ₂ O	63	S	21		
1 PURŠKIMAS	 00-09			Stomp® CS 2,00 l	
2 PURŠKIMAS	 14-15			Agroplus Extra Mo-B 1,00 l Agroplus UniPro 0,50 l pH AntiBor 0,40 l Corum® 1,00 l Dash® 1,00 l Mavrik® 0,20 l	

- Trąšos, skirtos tręšimui per lapus
- Augimo reguliatoriai
- Birios trąšos
- Herbicidai
- Insekticidai
- Fungicidai
- Paviršiaus aktyviosios medžiagos
- Dirvožemio gerinimas

Daugiau informacijos apie produktus, jų panaudojimą ir individualias rekomendacijas suteiks mūsų agronomai-konsultantai, su kuriais galite susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu.

