

Breastfeeding and Postnatal Care

الرضاعة الطبيعية والرعاية بعد الولادة



المحتويات

3	فوائد الرضاعة الطبيعية
3	ما هي مدة الإرضاع من الثدي التي يحتاج إليها طفلي؟
4	الرضعة الأولى من الثدي
5	سحب الحليب بواسطة اليد
6	كيفية حفظ حليب الأم
7	الرضعات الأولى من الثدي
7	مساعدة الطفل في الإمساك بالثدي
8	الرضاعة البيولوجية
9	متى يتم إرضاع طفلي
10	بعض وضعيّات الإرضاع من الثدي
11	علامات الإمساك الصحيح بالثدي
12	كم مرة في اليوم قد يرغب طفلي في الرضاعة من الثدي
13	علامات تشير إلى أن طفلي يأخذ كفافاته من الحليب
13	علامات تشير إلى أن طفلي ليس بخير
14	زيادة كمية الحليب
14	إرشادات للمحافظة على مخزون حليبك
15	أسئلة شائعة
17	العودة إلى العمل
18	مسائل تتعلق بالإرضاع من الثدي
18	الكلمات المؤللة أو المتشقة
18	العناية بالحلمة
18	امتلاء الثدي
19	انسداد قنوات الحليب
20	التهاب الثدي
20	التدخين والرضاعة
21	الكحول والإرضاع من الثدي
21	المهارات الممنوعة والأطفال الرضع
21	الاعتناء بنفسك
22	العناية بالمرح
22	التغذية السليمة
23	شعور ما بعد الولادة
24	منع الحمل
25	الاعتناء بطفلك
25	المصاصة المطاطية / الـlـahـayـah
27	ما تحتاجينه من دعم لدى عودتك إلى المنزل برفقة طفلك
28	مصادر أخرى

فوائد الرضاعة الطبيعية (IMPACT OF FEEDING CHOICE)

الرضاعة الطبيعية (الإرضاع من الثدي) هي الغذاء الذي تهديه الطبيعة لطفلك، ويشتمل على كافة العناصر الغذائية الضرورية بالكميات المطلوبة لمساعدة رضيعك على النمو. هذا وأن للرضاعة الطبيعية الكثير من الفوائد كالمشاركة في نمو دماغ الطفل وبصره وكلامه ونمو فكه.

إلى جانب ذلك، تحمي الرضاعة الطبيعية صحة الأم، حيث تحميها من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبكتيريا وداء ترقق العظام.

فضلاً عن ذلك، يتعرض الأطفال الذين لم يتناولوا حليب الأم لخطر الإصابة بـ

- ♥ الحساسية
- ♥ الربو
- ♥ الإسهال
- ♥ التهابات الأذن والمجاري التنفسية

وتزداد أيضاً خطورة تعرض هؤلاء الأطفال للتلاميذ المفاجئ للرضيع وبعض أنواع السرطانات التي تصيب الأطفال وداء السكري.

ما هي مدة الإرضاع من الثدي التي يحتاج إليها طفلي؟ (How long can my baby breastfeed for?)

توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) ودائرة الصحة في نيويورك ويلز بالتالي:



- ♥ إرضاع طفلك خلال الأشهر الستة الأولى.
- ♥ لا يحتاج الطفل طعاماً أو شراباً باستثناء حليبك خلال الأشهر الستة الأولى من حياته.
- ♥ استمر في إرضاع طفلك لمدة سنتين أو أكثر.
- ♥ عندما يبلغ طفلك ستة أشهر - ابدأ بتحضير الأطعمة المغذية له - زوري الموقع الإلكتروني الخاص ب التربية الأطفال
- ♥ وخذلي إلى الممرضة المسئولة عن صحة طفلك وعائلتك. (راجع الصفحة الأخيرة للحصول على معلومات الاتصال).

الرضعة الأولى من الثدي (The first breastfeed)

بعد الولادة، احرصي على حصول التلامس الجسدي بينك وبين طفلك لأطول فترة ممكنة.



ويقصد بالالتامس الجسدي، وضع طفلك عارياً (بين ثدييك) على أن يتم تغطية كليكما بمنشفة أو بطانية.

تأكدِي أن يكون أنف طفلك مكسوفاً لِيُسْتَطِعَ التنفس.

تساعد هذه الوضعية طفلك على الشعور بالدفء، وإذا لم يتم إزعاجه، سيجد سبيلاً إلى ثدييك ويبداً بالرضاة.

إذا كنت غير مطمئنة، ستكون هناك قابلة قانونية تقدم لك الدعم والمساعدة.

قد يحتاج طفلك في المرة الأولى بعضاً من الوقت ليمسك بثديك. لذا من المهم أن يبقى التلامس الجسدي بينك وبينه وأن تفسحي له الوقت للتكيف مع وضعه بعد الولادة. أما الرضاعة من الثدي فسيتعلّمها لوحده بالفطرة.

تحتاج بعض النساء للدواء خلال مرحلة المخاض ما ينعكس على أطفالهن إذ يحتاج بعضهم للمساعدة في إيجاد ثدي الآم والبدء في الرضاعة. وستكون هناك قابلة قانونية تقدم لك الدعم والمساعدة.

إذا تأخرت عملية الإرضاع من الثدي. فمن المهم أن تسحبي حليبك في هذا الوقت (ويفضل أن تقومي بذلك خلال الساعتين التاليتين للولادة) ما يحفز ثدييك على زيادة إنتاج الحليب. فيرضع طفلك هذا الحليب الذي يسمى (اللباء).

سحب الحليب بواسطة اليد (Hand expressing)

من المهم أن تعرفي كيفية سحب الحليب، وهذه العملية ما هي إلا خبرة تكتسبينها مع الوقت وأنت أفضل من يقوم بها.

متى تحتاجين لسحب الحليب بواسطة اليد:

- ♥ إذا كنت بعيدة عن طفلك
- ♥ إذا كنت غير قادرة على إرضاع طفلك في الوقت الذي يرغب فيه بالرضاعة
- ♥ إذا كان طفالك يواجه صعوبة في التمسك بالثدي ويريد الإرضاع منه
- ♥ لتلبين الـحالـة (المنطقة الداكنة التي تحيط بالحلمة) مما يجعل مـسـكـ الطـفـلـ للـثـدـيـ أـسـهـلـ
- ♥ لـزيـادـةـ كـمـيـةـ الـحـلـبـ الـذـيـ تـنـتـجـيـنـهـ

كيف تسحبين الحليب بواسطة اليد (How to hand express)



١. اغسل يديك بالصابون والماء
 ٢. دلكي ثديك برفق بدءاً من أعلىه وتابعِي بالجهة العلوية دون أن تنسِي الجهة السفلية منه.
 ٣. احملِي وعاءً عميقاً وضعِيه أسفل الثدي لجمع الحليب
 ٤. ضعي إبهامك مقابل سبابتك على هالة الحلمة (المنطقة الداكنة التي تحيط بالحلمة) بشكل حرف "C"
 ٥. اعصري الحلمة برفق بواسطة الإبهام والسبابة معاً وكرّري العملية على نحوٍ يفاعي.
 ٦. عندما يتوقف تدفق الحليب، غيري وضعية إبهامك وسبابتك وكرّري الخطوتين الرابعة إلى الخامسة
 ٧. تابعي العملية لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة
 ٨. من الضروري أن تسحبِي الحليب لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة من كل ثدي فذلك من شأنه أن يساعد على تحفيز الحليب وزيادة إنتاجه. واحرصي على متابعة عملية السحب خلال هذا الوقت حتى لو بدا لك أن حليبيك توقف عن التدفق.
 ٩. ثم انتقلِي إلى الثدي الآخر وكرّري الخطوات المذكورة أعلاه.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول سحب حليب الثدي وحفظه ونقله، يمكنك الاستعانة بكتيب "سحب حليب الثدي لطفالك خلال مرحلة الحضانة".

كيفية حفظ حليب الأم (Storing your breast milk)

المجمدة	البراد (الثلاجة) (٤ درجات مئوية أو أقل)	درجة حرارة الغرفة (٢١ درجة مئوية أو أقل)	حليب الأم
يُحفظ الحليب لمدة أسبوعين في المجمدة الموجودة داخل البراد. كما يحفظ لمدة ٣ أشهر في حجرة المجمدة الموجودة في البرادات التي لها أبواب منفصلة عن المجمدة.	يُحفظ حليب الأم في المستشفى لمدة ٤٨ ساعة ويحفظ في المنزل من ٣ إلى ٥ أيام. ومن المستحسن حفظه في مؤخرة البراد لكونه المكان الأكثر برودة	بعد سحب الحليب لطفلك في المستشفى، لا بد من وضعه في البراد خلال ساعة من سحبه. ويبقى صالحًا للاستعمال من ٦ إلى ٨ ساعات خارج البراد لكي يستعمل في المنزل	حليب الأم المسحوب للتوصو في وعاء مغلق
لا تعيدي تجميد الحليب	استعمليه خلال ٤ ساعات	استعمليه خلال ٤ ساعات أو أقل	يُذاب حليب الأم المجمد مسبقاً من خلال وضعه في البراد دون الحاجة إلى تدفئته.
لا تعيدي تجميد الحليب	استعمليه خلال ٤ ساعات أو حتى الرضاعة التالية.	استعمليه على الفور ولا تخفظي به	يُذاب حليب الأم خارج البراد عن طريق وضعه في ماء دافئ
تخلصي من الحليب	تخلصي من الحليب	تخلصي من الحليب المتبقى عند انتهاء طفلك من الرضاعة.	بدأ الطفل بالرضاعة

إملائي ٤٪ الوعاء فقط بحليبك لأنّه سيتمدد خلال عملية التجميد مما قد يعرض الوعاء للإنفجار في المجمدة. ♥

ينبغي تدفئة حليب الأم المسحوب إلى أن يصبح بدرجة حرارة الغرفة ليتمكن طفلك من رضاعته. ♥

يجب عدم استخدام المايكرويف أبداً لتدفئة الحليب لأنّه قد يتسبب بحرق في فم الطفل وحلقه كما قد يغير في المكونات الغذائية التي يحتويها الحليب. ♥

تنظيف المعدّات (Cleaning Equipment)

إن كافية أدوات الإرضاع من الثدي بما فيها مضخة الثدي بأجزائها المختلفة وواقي الحلمات والأدوات الأخرى يجب أن يتم:

غسلها بالماء البارد. ○

غسلها بالكامل بواسطة صابون سائل وماء دافئ (سائل الجلي يعّد مناسباً). ○

غسلها بالكامل بالمياه الجاري و ○

وضعها في وعاء نظيف محكم الإغلاق. ○

لا حاجة لتعقيم أدوات سحب الحليب التي تستعمل في المنزل. ♥

الرضعات الأولى من الثدي (Early breastfeeds)

تشكل الساعات والأيام الأولى التي تلي ولادة طفلك بداية لعلاقة جديدة بينكما، وهي تماماً كغيرها من العلاقات الجديدة. تحتاج لبعض الوقت والممارسة لكي يرتاح أحدهما مع الآخر ولكنني تشعر بالثقة حيال إرضاع طفلك.

إذا رضع طفلك جيداً بعد ولادته، قد لا يحتاج للرضاعة مجدداً لفترة تصل إلى سنتين ساعات. من المهم أن:

يحدث تلامس جسدي بينك وبين طفلك قدر المستطاع خلال الساعات الـ 48 الأولى من حياته إلى أن يتمكن من مسك ثديك جيداً والرضاعة منه فذلك يتيح له سهولة الوصول إلى ثديك وفرصة أكبر لتعلم الرضاعة من الثدي.

تتعالّم على إدراك تلميحات طفلك بحاجته إلى الإطعام فهي سبيلك لمعرفة استعداده للرضاعة. ومن المستحسن أن تعطيه ثديك ما إن يبدأ بهذه الإشارات.

مساعدة الطفل على الامساك بالثدي (Helping baby to attach to your breast)

إن الجلوس بوضعية مريحة مع إسناد ظهرك وقدميك يساعدك على الاسترخاء كما يساعد على إفراز الأوكسيتوسين أي الهرمون المسؤول عن إدرار الحليب.

من المهم إزالة اللف عن طفلك ووضعه بصورة مواجهة لك وبإمكانك أن تسنديه من أعلى ظهره وأوكتافيه واحرصي على أن يتمكّن من تحريك رأسه ورقبته بحرية.

عندما تُحضن الأم طفلها ويتمامسان جسدياً (أي عندما تضعه بين ثدييها) ويكون الطفل مستعداً للرضاعة عادة ما يجد سبيله للثدي بنفسه عبر حاسة الشم واللمس (منعكس الدواران).

يتيح منعكس الدواران لطفلك البحث عن ثديك وفتح فمه واسعاً وما يحفّزه على ذلك هو احتكاك وجنتيه أو ذقنه بجلد ثديك.

يشكل الوقوف وضعية أخرى تساعد طفلك على تمكّنه بالثدي فيتدلى ثدياك وتبرز حلمتك في وضعهما الطبيعي. و تستطيعين وبالتالي رفع طفلك باتجاه ثديك.

تكتشف كل أم و طفلها الطريقة الخاصة للتمسك بالثدي. ومن المهم أن تجدي مع طفلك الوقت لتعلّماً بذلك سوية. إذا كنت بحاجة للمساعدة، ستشرح لك القابلات وغيرهن من فريق العمل كيفية مسّك الطفل للثدي.

الرضاعة البيولوجية (Biological feeding)



لاحظي هذه الأُم وهي متکئة على ظهرها وطفلها مُمدد على بطئها. تبدأ هذه الوضعية منذ أن يبصر الطفل النور وخلال التلامس الجسدي بينه وبين أُمّه أي عند إلقاءه على صدر أُمّه عند الولادة ليستلقي بين ثدييها، وما يلبث أن يتحرّك الطفل باتجاه الحلمة ويتمسّك بالثدي. هذه الوضعية مريحة وتبعث الراحة والطمأنينة في قلب الطفل وأُمّه ولذلك تتبع الكثير من الأمهات الإرضاع بهذه الوضعية.

تساعد هذه الوضعية الطفل على التمسّك جيّداً بثدي أُمّه خاصة وأنّه سيفتح فمه واسعاً. وخلالها يتمّ التواصل البصري الجيد بين الأُمّ ووليدتها. كما تستطيع الأم الاتّكاء للخلف والاسترخاء.

متى أرضع طفلي؟
(When to feed my baby)

Baby Feeding Cues (signs)



EARLY CUES - "I'm hungry"



- Stirring



- Mouth opening



- Turning head
- Seeking/rooting

MID CUES - "I'm really hungry"



- Stretching



- Increasing physical movement



- Hand to mouth

LATE CUES - "Calm me, then feed me"



- Crying



- Agitated body movements



- Colour turning red

Time to calm crying baby

- Cuddling
- Skin to Skin on chest
- Talking
- Stroking



بعض وضعيات الرضاعة الطبيعية (SOME FEEDING POSITIONS)



وضعية الإرضاع التقليدية



وضعية الإرضاع بطريقة السيدة العذراء



وضعية التوأم أو كرة القدم



الاستلقاء على الجنب

علامات الإمساك الصحيح بالثدي (SIGNS OF CORRECT ATTACHMENT)

الإمساك الخاطئ للثدي	الإمساك الصحيح للثدي
عندما يمْضِ طفلك الثدي تشعرين كما لو أنه يقرص حلمتك أو ينزعها وقد يؤلم ذلك	لا ينبغي أن يسبب لك الإمساك بالثدي ألمًا لكنك قد تشعرين بانزعاج طفيف في بداية مرحلة الرضاع من الثدي
تبعد وجهتا طفالك مشفوفة إلى الداخل كما لو أنه يشرب بواسطة القصبة	تبعد وجهتا طفالك متflexتين وذلك دليل على أن طفالك يطّبع فمه جيداً على ثديك
ثمة مسافة بين ذقن طفالك وثديك	ذقن طفالك يلامس ثديك جيداً
يبعد صدر طفالك عن صدرك وربما يكون باتجاه السقف	صدر طفالك يلامس صدرك
يستمر الطفل باندفاعه السريع في متص الكلي لفترات قصيرة وقد تشعرين بألم مستمر في الحلمة	قد تلاحظين في بداية الأمر أن طفالك يندفع بنمط سريع في متص الثدي لفترة قصيرة وما يلبث أن يتحول ذلك إلى إيقاع بطء وقد ترافقه حركات كبيرة في الفك
يمسك الطفل بالحلمة ثم يتركها وما يلبث أن يغفو على ثديك بحيث يحتاج إلى تحفيز دائم كي يتبع الرضاعة من الثدي	يأخذ الطفل استراحة قصيرة ويعاود المص مجدداً دون الحاجة إلى التحفيز
إذا أصدر طفالك بشكل دائم صوتاً يشبه الطقطقة فذلك يعني أنه لا يمسك الحلمة بشكل سليم	قد تسمعين طفالك وهو يبلغ الحليب
عندما يترك الطفل الثدي. تبدو الحلمة مهروسة ومشوهة وقد يظهر عليها خط في الوسط	تستعيد حلمتك شكلها الطبيعي عندما يتوقف طفالك عن الرضاعة من الثدي



كم مرّة في اليوم يرغب طفلي في الرضاعة من الثدي
(How often will my baby want to be fed?)

حجم معدة طفلك خلال الأسبوع الأول
(Stomach size of your baby in the first week)



من المهم أن يرضع طفلك مراراً لأنّ:

معدته صغيرة

حليب الأم سهل الهضم

الأطفال يرضعون كميات قليلة من حليب الأم خلال الأيام الأولى

ليس للأطفال أي مفهوم للوقت فلهذا من المهم عدم تقيد الرضاعات بأوقات معينة. ونود الإشارة بأنّ الطفل، كمعدل عام، قد يرضع على الأقل من ٥ إلى ١٠ مرات خلال الساعات الـ ٢٤ الأولى. وقد يزداد عدد الرضاعات التي يأخذها طفلك خلال الأيام القليلة الأولى. وقد يرضع من ٨ إلى ١٢ مرّة خلال فترة ٢٤ ساعة عندما يستقر مخزون الحليب لديك.

لدى عودتكما إلى المنزل، من الطبيعي أن يرضع طفلك من ٨ إلى ١٥ مرّة في اليوم في بعض الأيام ومن ٦ إلى ٨ مرات يومياً في أيام أخرى.

لا يستطيع الطفل أن يفترط في الرضاعة من الثدي لأن شهيته تتماشى بالفطرة بما يتواافق مع حاجات جسمه. وهكذا قد يرضع طفلك على دفعات متكررة تخللها فترات راحة أو قد يرضع على نحو أكثر هدوءاً.

ويكمن السر في مراقبة إشارات الرضاعة من الثدي الخاصة بطفلك وليس مراقبة الساعة.

العلامات التي تشير إلى أن طفلي يأخذ ما يكفيه من الحليب (Signs that my baby is feeding well)

عندما يدّرك حليبك بعد ٣ إلى ٥ أيام من الولادة، تشير العلامات التالية إلى أن طفلك يأخذ ما يكفيه من الحليب:

- ♥ عندما تُحصل على ٥ من المفاضات الجاهزة المبللة كثيراً أو
- عندما تُحصل على ٦ إلى ٨ فوط قماش يومياً مبللة باللون الأصفر
- ♥ عندما يتغوط طفلك من مرّة إلى مرتين على الأقل في اليوم غائطاً رخواً أصفر اللون

حين يترسخ مخزون الحليب لديك في الأسابيع الأولى:

- ♥ تصبح رضعات الطفل غير محدودة بحيث يرضع على الأقل ٦ مرات في اليوم. مع الإشارة إلى أن معظم الأطفال يرضعون أكثر من ذلك.
- ♥ يبدو الطفل بصحة جيدة ولون بشرته طبيعي ويكون يقظاً ونشيطاً ويستيقظ من أجل الرضاعة من الثدي.
- ♥ يزداد وزن الطفل.
- ♥ بدلاً من التغوط عند كل رضعة، سيتغوط طفلك مرة أو مرتين في اليوم. بحيث ينخفض عدد مرات التبزز كلما كبر الطفل.

العلامات التي تشير إلى أن طفلي ليس بخير (Signs that my baby is not well)

- ♥ ينام كثيراً ويبدو خاماً ولا يستيقظ من أجل الرضاعة
- أو يبدو سريع الانفعال (ي بكى كثيراً) ولا يهدأ حتى عند حمله
- ♥ يقلّ عدد المفاضات المبللة والمتسخة يومياً
- قد يبدو فم طفلك جافاً وكذلك الأمر بالنسبة لبشرته
- ♥ يرضع أقل من ست مرات في اليوم
- قد يزداد وزنه قليلاً أو قد يبقى على حاله
- ♥ يختلف لون بشرته عن اللون الطبيعي
- ترتفع حرارته عن الـ ٣٧,٤ درجة مئوية أو تقلّ عن الـ ٣٦ درجة مئوية

المعلومات المذكورة هي معلومات عامة، لذا لا تتردد في التحدث إلى طبيبك أو مرضي الأطفال والصحة العائلية أو الاتصال على الرقم ... إذا احتجت لذلك.

زيادة كمية الحليب

(Building up your milk supply)

- لزيادة كمية حليبك، من المهم جداً إرضاع طفلك كلما احتاج لذلك**
- تستغرق زيادة كمية حليب الثدي من أربعة إلى ستة أسابيع وسيكون ذلك متماشياً مع حاجات طفلك.**
- في هذه المرحلة عادةً ما تزداد رغبة طفالك للرضاعة خلال النهار والليل أي من ٨ إلى ١٢ مرة في اليوم**
- ستشعرن في بعض الأحيان أنّ ثدييك شديداً الامتناع وفي أحياناً أخرى يكونان أكثر ليونة**
- عندما يبلغ طفالك ستة أسابيع من العمر، ستشعرن بأن ثدييك أصبحاً أكثر ليونة عند لسهماً ويعودان إلى طبيعتهما.**
- نتيجة لهذه التغييرات، قد تشعر بعض النساء بأنهن قد «فقدن حليبهن» لا سيما وأنّ معظم الأطفال يرون بمرحلة النمو السريع خلال هذه الفترة.**
- عندما تستقر كمية الحليب عندك فسيكون بإمكانك سحب مقدار ١٠ - ١٠٠ ملي لتر فقط بعد إرضاع طفالك، وبهذا يكون جسمك قد تلائم مع حاجة طفالك.**
- إذا كان الهدف من سحب حليبك هو زيادة إنتاجه، فإن طفالك سيرضع هذا الحليب الإضافي ولذلك لن تلاحظي زيادة في الكمية التي تسحبينها.**
- يساعدك الإرضاع المنتظم والمتكرر من الثدي على زيادة مخزون الحليب لديك.**
- فكلماً إزدادت رضاعة طفالك كلماًًً ازداد إنتاج الحليب لديك.****
- إذا كنت قلقة إزاء قلة إنتاجك للحليب لا تتردد في طلب المساعدة بصورة مبكرة.
 (راجع الصحفة الأخيرة للحصول على أرقام الاتصال)**

إرشادات للمحافظة على مخزون حليبك

(Guidelines for maintaining your milk supply)

- نأكّدّي من أن طفالك يمسك الثدي بصورة جيدة**
- دعي طفالك يرضع كلماًً رغب في ذلك**
- احرصي على إرضاع طفالك خلال الليل فعندّها ترتفع نسبة هورمون إنتاج الحليب (البرولاكتين)**
- من المهم أن تُرضعي طفالك طلماًً يرغب في ذلك من الثدي الأول ومن ثمّ إعرضي عليه الآخر. واحرصي على إرضاعه في المرة الثانية من الثدي الآخر.**
- احرصي علىأخذ قسط كبير من الراحة أو النوم عندما يكون الطفل نائماًً. وتذكري أنّ ذلك مطلوب فقط خلال الأشهر الأولى.**
- من المهم أيضًاً أن تنتبهي إلى تلميحات طفالك بحاجته إلى الرضاعة. مع العلم أنّ إعطاءه المصاصة (اللهابيّة) قد يحجب عنك هذه التلميحات ويؤخر الرضاعة من الثدي وبالتالي قد يقلّل من مخزون حليبك.**
- من المهم أن تعطي طفالك حليبك فقط خلال الأشهر الستة الأولى وتجنب إعطائه أي سائل آخر (مثل حليب الأطفال الصناعي أو الماء) فذلك من شأنه أن يقلّل من مخزون حليبك.**

أسئلة شائعة (Frequently asked questions)

هل يجب الإكثار من شرب الماء واللتحب خلال مرحلة الإرضاع من الثدي؟

احرصي على الشرب عندما تحسين بالعطش وننصحك بشرب من لترتين إلى ثلاثة من الماء يومياً. وإذا شربت كمية أكبر من ذلك فهذا لا يساعدك على زيادة إنتاج الحليب بل يمكن أن يقلل منه.

هل تتأثر جودة حليبكمي وكميته بنظامي الغذائي؟

يتكون حليب الأم استجابةً لتكرار وانتظام الرضاعة من الثدي. ولا يسحّ إنتاج هذا الحليب إلا عند انخفاض كمية الطعام الذي تتناوله الأم المرضعة إلى مستويات متدنية (أي ما يقارب مرحلة الجماعة). وبالتالي فإن صحة المرأة وطاقتها هما اللذان سيتأثران بسوء تغذيتها وليس إنتاج حليبها.

هل من الصعب خسارة الوزن خلال الإرضاع من الثدي؟

قد يساعد الإرضاع من الثدي الأم في العودة إلى وزنها الذي كانت عليه ما قبل الحمل دون أن يتغير نظامها الغذائي المعتمد (المزيد من المعلومات حول التغذية السليمة راجع الصفحة ٢١).

هل يمكنني ممارسة التمارين الرياضية خلال فترة إرضاع طفلي من الثدي؟

ينصح كلّ فرد بما في ذلك الأم المرضعة بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة والمعتدلة. إذا كنت تخطّطين لممارسة التمارين الرياضية المجهدة، ننصحك بإرضاع طفلك قبل مارستها وذلك لأنّ حمض اللبن (اللاكتيك) الذي تفرزه عضلاتك خلال ممارسة التمارين قد يغيّر من طعم الحليب لفترة قصيرة مما قد يزعج الطفل دون أن يؤذيه.

ما هي أهمية الحصول على قسط من الراحة؟

تشعر معظم الأمهات بالتعب خلال الأشهر القليلة الأولى لأنهن في طور التكيف مع الاستيقاظ خلال الليل لإرضاع الطفل وتهديته. فاحرصي على النوم خلال النهار عندما يكون طفلك نائماً وعلى الاعتناء بنفسك كي تتمكنّي من الاعتناء بطفلك. ومع مضي الأسابيع الأولى، لا يلبث أن يصبح الإرضاع من الثدي أكثر سهولة وأقل إرهاقاً.

هل من الممكن أن تكون نوعية الحليب الذي أنتجه سيئة؟

تقلق الكثير من الأمهات عندما لا يهدء أطفالهن أو عندما يعتقدن أنّ حليبهن غير كثيف أو خفيف فينتابنهن شك إزاء جودة حليبهن.

وهنا بقدر الإشارة إلى أنّ حليبك يتغيّر مع كل رضعة ومع نمو طفلك أيضاً، فهو يتلائم مع حاجات طفلك الغذائية المتغيّرة. يتّخذ حليب الأم الناضج (بعد مرور حوالي أسبوعين) لوناً مائلاً للأزرق شبيهاً باللتحب المنزوع القشدة. ولا تقلقي من ذلك، لأن ذلك طبيعي وليس دليلاً على سوء جودة حليبك.

السلوك الطبيعي للمواليد الجدد (Normal newborn behaviour)

لكل طفل ما يميّزه عن غيره ولا شك أنّه يختلف عن باقي الأطفال بشخصيته ومزاجه.

كما يطّور كل طفل نمط غذائه ونومه ومعدّل نموه وما يحب وما يكره.

خلال الأسابيع الأولى:

الاختلاف في عدد رضعات الطفل: في بعض الأحيان، قد يرضع طفلك مرات عدّة (أي كل ساعة أو ساعتين) لكنه في أحيان أخرى قد تكون الفترة الزمنية بين الرضعة والأخرى أطول (أي من أربع إلى خمس ساعات). فاحرصي على إرضاع طفلك تبعاً لحاجاته.

صعوبة في تهدئة الطفل ولا سيّما عند العصر: لذا يطلب معظم الأطفال الرضاعة المهدّئة من الثدي (أي مجموعة متتالية من الرضعات) عند العصر أو في المساء. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرضعات القصيرة والمترددة تساعد في زيادة حليبك. كما أن الاستراحة أحياناً خلال النهار قد تساعدك على تلبية هذه الرضعات.

لهاث الطفل أو اختناقه أو شدّه للثدي نتيجة لانخفاض مستوى حليب الأم: مع نصائح الطفل ونمّو عادة ما يتكيّف طفلك مع تدفق حليبك. فإذا كان يشد ثديك أو يلها أو يختنق ما عليك إلا:

إعادته إلى ثديك بعد أن يستقر تدفق الحليب

الاتّكاء إلى الخلف ووضع طفلك فوق

إذا خّوّل هذا الأمر إلى مشكلة، راجعي الصفحة الأخيرة من هذا الكتاب للحصول على المساعدة.

التجمّسُ بعد الرضاعة من الثدي: غالباً ما يتجمّس الأطفال بفردهم وأحياناً لهم لا يزالون يسكنون بالثدي. هذا وأن وضع الطفل بصورة مستقيمة على صدرك يساعدك على التجمّس.

النوم خلال الرضاعة من الثدي: يدلّ هذا السلوك عند بعض الأطفال إلى إنّهم قد شبعوا بينما يدلّ عند البعض الآخر إلى أنّهم يأخذون قسطاً من الراحة استعداداً لتابعة الرضاعة ثانيةً. ستكتشفي بنفسك مع الوقت السلوك الطبيعي لطفلك الخاص بالرضاعة.

النمو السريع: هي مراحل من النمو والتطوير السريعين التي يشهدها طفلك من عمر ١ إلى ١٤ يوماً وعمر ٤ إلى ٦ أسابيع و ٣ إلى ٦ أشهر. ويبدو طفلك خلال هذه الفترة مضطرباً وصعب الإرضاء كما أنّه يرضع في أغلب الأحيان. مع ذلك، يختلف كل طفل عن غيره وقد تختلف هذه الفترات من طفل لآخر.

الرضاعة من الثدي والاستيقاظ ليلاً: من الطبيعي أن يستيقظ الأطفال ليلاً طلباً للرضاعة وفي بعض الأحيان لأنّهم يحتاجون لاحتضانهم كي يهدأوا وتجدر الإشارة هنا أنّه عادةً ما يبدأ الأطفال بالنوم طيلة الليل عند بلوغهم قرابة السنة.

النوم (Sleeping)

- ❖ يختلف كل طفل عن غيره كما تختلف قدرته على النوم أيضاً.
- ❖ من الطبيعي أن يرضع الأطفال مراراً (أي كل ساعتين أو ثلاث) خلال الأيام الأولى ولا سيما أثناء الليل.
- ❖ لا يعني كثرة استيقاظ طفلك بأنه مزعج فهو بحاجة لبعض الوقت كي يتعلم كيف ينام لفترات أطول هذا بالإضافة إلى أن ذلك يشكل جزءاً من مراحل تطوره الطبيعي.
- ❖ لا يملك طفلك القدرة على الهدوء خلال البكاء لذا فهو بحاجة لمساعدتك.
- ❖ يساعد حمل طفلك وضمه على تهدئته عند ازعاجه؛ وكوني على ثقة بأنك لا تدلينه لدى القيام بذلك.
- ❖ أظهرت البحوث أن الأهل الذين يستجيبون لمطالب أطفالهم ينعمون "بأولاد ذو طلبات أقل وأكثر اعتماداً على أنفسهم عندما يكبرون".
- ❖ إن معرفة علامات تعب طفلك ووضعه في السرير عندما تظهر عليه سيساعدك على تعلم النوم بنفسه. أما إذا أصبح متضايقاً فهو بحاجة للمساعدة لتهدئته ليستطيع النوم.
للحصول على مزيد من المعلومات والدعم راجعي الصفحة الأخيرة.

العودة إلى العمل (Going back to work)

- ❖ يفرض العمل خارج المنزل على كثير من الأمهات الابتعاد عن أطفالهن.
- ❖ بفضل التحضير المسبق والدعم تتمكن كثير من النساء على الجمع ما بين العمل والإرضاع من الثدي
- ❖ إليك بعض سبل التوفيق ما بين الإرضاع من الثدي والعمل:
 - احضار الطفل إلى مكان عملك للرضاعة
 - سحب حليبك أثناء وجودك في العمل
- ❖ خلال فترة الحمل أو إجازة الأمومة، خذلي إلى مديرك حول سحب حليبك خلال العمل وأو حول أخذ فترات استراحة لإرضاع طفلك. ولا تنسى أن تذكره له حاجتك إلى مكان نظيف وخاص كي تتمكن من سحب حليبك أو إرضاع طفلك.
- ❖ أثناء وجودك في العمل، اسحب حليبك في الوقت المعتمد لإرضاع طفلك أو اسحبه بإنتظام طالما كنت تستطعين ذلك. فهذا من شأنه المحافظة على مخزون حليبك والمساعدة في الوقاية من التهاب الثدي (انظر إلى الأسفل).
- ❖ قد تحتاجين لمعلومات حول كيفية سحب حليبك وحفظه ونقله وطرق إرضاع طفلك الحليب المسحوب.
- ❖ من المهم أن تضمني تلبية حاجاتك وحصولك على الدعم بينما تتكيفين مع المتطلبات الناجحة بسبب ابتعادك عن طفلك أثناء وجودك في العمل.
- ❖ يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الجمعية الأسترالية للإرضاع من الثدي أو من خلال مرضية صحة الطفل والعائلة (راجع الصحفة الأخيرة).

مسائل تتعلق بالإرضاع من الثدي (BREASTFEEDING ISSUES)

الحلمات المؤلمة أو المتشقة (Painful or damaged nipples)

- ♥ إذا شعرت بألم في حلمتيك مما تحتاجين فقط لتغيير وضعية طفلك قليلاً (مثلاً الميل بجبينه إلى الخلف قليلاً لكي يتلائق ذقنه بأسفل صدرك).
- ♥ بينما لا يزال طفلك متمسكاً بصدرك، مما تستطعين أيضاً الإمساك بصدرك على شكل حرف C لتعصري مزيداً من الحليب في فمه.
- ♥ إذا لم تجد أي من الطريقتين أعلاه مجدية في تخفيف ألم الحلمة، أبعدي طفلك عن الثدي وذلك بإيقاف عملية المص برفق (ضعي إصبعك عند زاوية فمه واسحبى الحلمة منه) ويمكنك بعد ذلك إعادةه إلى ثديك.

العناية بالحلمة (Nipple care)

- ♥ إن الشعور بالألم في حلمة الثدي هو من الأمور الشائعة خلال الأيام الأولى حين لا يزال طفلك يتعلم كيفية الإمساك بالثدي والرضاعة منه.
- ♥ احرصي على أن يمسك طفلك الثدي بإحكام وعديلاً وضعيته إذا شعرت بالألم أو عدم الارتياح خلال الإرضاع من الثدي فذلك من شأنه أن يساعد على منع الألم في الحلمتين.
- ♥ اعصري بعضاً من حليبك بعد كل رضعة وامسحي به حلمتك وهالتها ما يحافظ على صحتهما وشفائهما أيضاً عند الإصابة بالتشقق تذكري أن تحافظي على جفاف الحلمتين قبل ارتداء ملابسك.
- ♥ إذا رغبت في استخدام مرهم لمنطقة الحلمة، احرصي على استخدام مرهم يحتوي على اللانولين المطهر فقط purified lanolin فالمراهم التي تحتوي على مكونات أخرى يجب إزالتها قبل إرضاع الطفل إضافة إلى أنها قد تسبب مزيداً من الأذى لحلمتيك.
- ♥ عند استخدام أحد المراهم، احرصي على اتباع تعليمات الشركة المصنعة له.

امتلاء الثدي (Breast fullness)

مع ازدياد إنتاج حليبك خلال الثلاثة إلى خمسة أيام التالية للولادة، قد تشعرين ببعض الألم نتيجة لامتلاء الثديين.

إذا كنت معتادة على ارتداء حمالة للصدر، احرصي على ارتداء حمالة صدر داعمة (خلال النهار) بحيث لا تكون ضيقة وتمكنك من إرضاع طفلك كلما رغب في ذلك. أمّا في المساء، فيفضل ارتداء قميص داخلي داعم (ويعرف في أستراليا بالـ *Crop top*) لأنّه يقي من الضغط على الثديين خلال الليل.

ربما يساعد وضع كممادات باردة على ثدييك مثل "كمادات الهلام الباردة" أو "كمادات الثلج" أو "كمادات أوراق الملفوف الباردة" في تخفيف الألم. ولا بدّ منأخذ النقاط التالية بعين الاعتبار لدى استخدام الكممادات الباردة.

- احرصي على عدم تغطية منطقة الحلمة بالكمادات الباردة
- ضعي الكممادة الباردة لمدة ١٥ - ٣٠ دقيقة في كل مرة و يمكنك تكرار ذلك لمدة ساعة.
- غلّفي الكممادة الباردة بواسطة غطاء واقٍ مثل منشفة صغيرة لتجنبها تضرر الجلد.

انسداد قنوات الحليب (Blocked ducts)

تنسدّ قنوات الحليب نتيجة لـ

- الضغط على الثدي بسبب ارتداء حمالة صدر ضيقة
- عدم إفراغ الثدي بشكل كامل
- الفترات الزمنية الطويلة ما بين الرضاعة والأخرى

وبالتالي فقد تلاحظين ما يلي:

- يصبح جزء من ثديك أحمر اللون وصلباً وساخن اللمس
- الشعور بالتوعّك مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة
- إليك الاقتراحات التالية لمعالجة انسداد قنوات الحليب:
 - ارضعي طفلك كلما رغب في ذلك
 - احرصي على أن يمسك الطفل الثدي بإحكام
- قبل البدء بالرضاعة، دلكي برفق التكتل (أي المنطقة الصلبة القريبة من الحلمة) بواسطة باطن أصابعك
- دلكي ثديك برفق خلال الرضاعة مما يساعد على إدرار الحليب

اسحببي الحليب من الثدي إذا كان الطفل لا يرغب في الرضاعة منه أو لتعزيز التخلص من التكتل قد تكون المسكنات مفيدة. فتأكد من الاستفسار عنها مع طبيبك أو الصيدلي أو الـ "Mothersafe" - خدمة الأدوية أثناء الحمل والرضاعة (راجع الصفحة الأخيرة للحصول على المساعدة).

- احرصي على ارتداء حمالة صدر غير ضيقة ولا تسبب الضغط على ثدييك
- ارتدي في المساء عند النوم قميصاً داخلياً داعماً (*Crop Top*)
- الراحة مجده

التهاب الثدي (Mastitis)

ينتج التهاب الثدي من عدم معالجة انسداد قنوات الحليب. أما الأسباب الأخرى فهي التالية:

- ♥ تشدق الحلمتين
- ♥ فائض في إنتاج الحليب خلال الأسابيع الأولى في الوقت الذي يتكيف فيه إنتاج الحليب مع حاجات طفلك.

أَمّا أعراض التهاب الثدي فهي التالية:

- إحمرار الثدي يصاحبه ألم وفي بعض الأحيان الشعور بحرارة في أحد أجزاءه
- الشعور بالتوءك مع ظهور أعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا
- الشعور بالارتفاع
- ارتفاع الحرارة

العلاج

- راجعي أعلاه فيما يتعلق بالاقتراحات لمعالجة إنسداد قنوات الحليب
- قومي بزيارة طبيبك فقد تحتاجين لأخذ المضادات الحيوية.
- للحصول على مزيد من المعلومات والدعم، اتصلي بمرضية صحة الطفل والعائلة أو بالجمعية الأسترالية للإرضاع من الثدي.

التدخين والرضاعة (Smoking and Breastfeeding)

من الأفضل إرضاع الطفل من الثدي حتى لو كانت والدته مدخنة.

يزداد خطر تعرّض الأطفال الذين يعيشون مع فرد مدخن في المنزل إلى متلازمة الموت الفجائي للرضيع (Sudden Infant Death Syndrome) (SIDS).

لقد ثبت أنّ النيكوتين ينتقل عبر حليب الأم وقد يؤثّر على إدرار حليبك ويختفّف من كميته. أمّا الطفل فقد يصبح سريع الغضب ومضرطاً.

نشجّع أي مدخن يحمل الطفل على القيام بالتالي:

- ♥ التدخين بعد الانتهاء من إرضاع الطفل أو حمله.
- ♥ ارتداء سترة لتمتصّ المواد الكيميائية الناجمة عن التدخين وخلعها لدى حمل الطفل أو إرضاعه.
- ♥ يمنع القانون التدخين في سيارة تضمّ ركّاباً دون السادسة عشر من عمرهم.
- ♥ لا يُسمح مطلقاً لأحد بالتدخين في منزلٍ يقطنه رضع أو أولاد صغار

خط الإقلاع عن التدخين 848 131 Quit Line

الكحول والإرضاع من الثدي (Alcohol and Breastfeeding)

ينتقل الكحول عبر حليب الأم حيث أنّ نسبة الكحول التي تنتقل عبر حليبك هي نفسها الموجودة في دمك. وتحث الأمهات المرضعات اليوم بعدم شرب الكحول خلال فترة الإرضاع من الثدي لما لذلك من تأثير على إدراة الحليب وتغيير طعمه ما قد يزعج الطفل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الكحول والإرضاع من الثدي زوري الموقع الإلكتروني للجمعية الأسترالية للإرضاع من الثدي (راجع الصفة الأخيرة)

المخدرات الممنوعة والأطفال (Illicit Drugs and Babies)

من الخطير تعاطي المخدرات الممنوعة (الماريجوانا والسبيد والكوكايين والهيرويين إلخ) عندما تعيشين برفقة طفل في منزل واحد. والسبب أنك قد لا تستجيبين له عندما يكون بحاجة إليك وقد تهملين في رعايته أيضاً.

لا ينصح بالإرضاع من الثدي عندما تتعاطين المخدرات الممنوعة التي ثبت أنها تنتقل عبر حليبك فتؤثر بالتالي على طفلك. وعندما يتوقف طفلك عن الرضاعة من الثدي سيعاني من أثار الانسحاب من تأثير المخدرات.

إذا كنت قلقة حيال ذلك، نرجو منك التواصل مع خدمة المخدرات والكحول عبر خدمة الصحة الاجتماعية المحلية راجعي الصفة الأخيرة).

الاعتناء بنفسك (TAKING CARE OF YOU)

يستغرق رحمك حوالي ستة أسابيع ليستعيد حجمه الطبيعي ويساعدك الإرضاع من الثدي على ذلك. خلال هذا الوقت، من الطبيعي أن تمرّي بمرحلة الحيض الشبيهة بالنزيف. تتعرّض معظم النساء للنزيف من يومين إلى اثنين عشر يوماً وما يلبث أن يقلّ ويصبح لون الدم أفتح وقد يستمر لمدة ٦ أسابيع.

كما تتعرّض بعض النساء خلال هذه الفترة لتشنجات في البطن أو تقلصات في الرحم (ويعرف ذلك بألم ما بعد الولادة). كما قد تلاحظين زيادة النزيف أثناء إرضاع طفلك من الثدي خلال الأيام الأولى. نشير إلى أن الشعور بألم ما بعد الولادة هو أمر طبيعي لأنّه يساعد الرحم في العودة إلى حجمه الطبيعي. إليك التدابير التي من شأنها أن تساعدك على الشعور بالراحة:

- ♥ مسكن خفيف للألم (احرصي على اتّباع التعليمات المذكورة على علبة الدواء)، و
- ♥ وضع كمّادة دافئة على المنطقة المصابة خلال الإرضاع من الثدي أو خلال سحب الحليب

تشير العلامات التالية إلى وجود عدو أو مداعاة للقلق:

- ♥ زيادة في النزيف (الحاجة لتغيير أكثر من فوطة صحّية كلّ ساعة)
- ♥ يعود لون النزيف مجدّداً إلى الأحمر الساطع
- ♥ يكون النزيف مصاحباً برائحة كريهة

حالما تظهر لديك هذه الأعراض ينبغي عليك مراجعة الطبيب العام أو قسم الطوارئ في المستشفى المحلي.

العناية بالجروح (Wound care)

إذا كان لديك ألم في المهبل أو غرز في منطقة العجان، احرصي على غسل هذه المنطقة بالماء ورّتبي عليها التجفيفها على الأقل مرتين في اليوم لضمان نظافتها جيداً. وننصحك باستخدام فوط الأمومة عند التزيف الحاد وبتبادلها كل ثلاث إلى أربع ساعات أو أكثر من ذلك إذا دعت الحاجة.

أما إذا أجريت لك عملية قيسارية، فنشجّعك على الاستحمام بشكل طبيعي. وتأكدِي عند نزع ضماداتك من غسل منطقة الجرح وتجفيفها جيداً بالتربيت عليها بواسطة منشفة جافة. إذا كان ثمة طيّة من الجلد تغطي الجرح، إرفعي هذا الجلد لتجفيف منطقة الجرح جيداً فهذا من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بالالتهابات.

إذا كنت قلقة بشأن جرحك (مثل وجود الإحمرار أو التقىحات) نرجو منك زيارة القابلة القانونية أو الطبيب العام أو قسم الطوارئ المحلي.

التغذية السليمة (Eating well)

من المهم أن تتناولِي ما لا يُطاب من المأكولات المتنوعة الغذائية لا سيما خلال مرحلة الإرتفاع من الثدي. لقد أطلق مجلس الصحة الوطنية والأبحاث الطبية "The National Health and Medical Research Council" عام ٢٠٠٣ "الإرشادات الغذائية الصحية التالية":

- ♥ تناولي الكثير من الخضار والبقول والفاكهه.
- ♥ تناولي الكثير من منتجات الحبوب (الخبز والأرز والمعكرونة والشعيرية) ويفضل أن تكون معدهة من الحبوب الكاملة
- ♥ تناولي بعضاً من اللحم، والسمك، والبيض والحبوب وغيرها من مصادر البروتين غير الحيوانية
- ♥ تناولي بعض منتجات الحليب (الحليب والأجبان والألبان) وحاولي اختيار الأنواع القليلة الدسم قدر المستطاع
- ♥ اشربي الماء حتى تروي عطشك (حوالى ليترتين في اليوم)
- ♥ تناولي كميات قليلة فقط من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح أو السكر أو المشبعة بالدهون

إذا كنت تشعرين أن نظامك الغذائي غير ملائم وتودين الحصول على مزيد من المعلومات نرجو منك التحدث إلى أخصائي الصحة أو طبيبك أو أخصائي التغذية.

يمكنك أيضاً مراجعة مجلس الصحة الوطنية والأبحاث الطبية والإطلاع على الإرشادات الغذائية للأطفال والراهقين في أستراليا من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

www.nhmrc.gov.au/publications/synopses/dietsyn.htm

شعور ما بعد الولادة (POSTNATAL FEELINGS)

الاضطراب النفسي العابر (Baby blues)

تنتاب النساء المصابات بالاضطراب النفسي العابر حالة من الانفعالات والانزعاج إلى جانب الإصابة بنوبات من البكاء دون أي سبب. يصيب هذا الإضطراب ٨٠٪ من النساء بعد ٣ إلى ١٠ أيام من الولادة وهو ناجٍ عن التغيرات الهرمونية التي ت nastęِّع الولادة. وعادةً ما يتبدّل هذا الإضطراب بعد بضعة أيام عندما تنعم الأم بقسط وافر من الراحة والدعم دون الحاجة لتلقّي أي علاج.

إكتئاب ما بعد الولادة (Postnatal depression)

اكتئاب ما بعد الولادة (PND) هو حالة تشعر خلالها النساء بالاكتئاب في أي وقت بعد مرور شهر إلى سنة من الولادة. يصيب هذا الاكتئاب ١٦٪ من النساء في أستراليا وقد تظهر أعراضه تدريجياً أو قد تظهر فجأة.

الانعزال عن الآخرين ووقوع أحداث كبيرة في الحياة كحالة الوفاة في العائلة أو الانتقال إلى مسكن جديد يرتبط بشكل وثيق باكتئاب ما بعد الولادة.

أما أعراضه فقد تشمل على ما يلي:

- ♥ الشعور بالقلق أو الاكتئاب
- ♥ العجز عن التفكير بوضوح أو إيجاد الكلمات المناسبة
- ♥ الانفجار بالبكاء من دون سبب واضح
- ♥ الشعور بالتعب والبالغة في القلق حيال قلة النوم
- ♥ عدم القدرة على أداء المهام المنزليّة
- ♥ ضعف الشهية أو فرطها
- ♥ ضعف الثقة بالذات
- ♥ التقليل من قيمة الذات
- ♥ فقدان الرغبة الجنسية
- ♥ الخوف من الوحدة أو الاجتماع بالآخرين
- ♥ سرعة الانفعال
- ♥ أفكار أو أفعال وسواسية
- ♥ التفكير بالانتحار أو التخطيط له أو القيام به

العلاج (Treatment)

من المهم أن تتحدى عن مشاعرك ومخاوفك مع مرضة صحة الطفل والعائلة أو مع طبيبك. كما قد يكون مجدياً أن تتحدى عن ذلك مع شريك أو مع من تثقين بهم من أفراد عائلتك أو أصدقائك. يختلف نوع العلاج الذي تحتاج إليه النساء المصابات باكتئاب ما بعد الولادة وفقاً لحذته. وقد يشتمل على ما يلي:

- ♥ حضور برامج مجموعات الدعم التي تتيح لك فرصة الالتقاء بنساء آخريات يعاني من أحاسيس مشابهة.
- ♥ الإرشاد النفسي
- ♥ تقديم المساعدة لك أثناء الاعتناء بطفلك
- ♥ تناول الأدوية المناسبة والتي عادة لا تؤثر على الإرضاع من الثدي. راجعي الصفحة الأخيرة للحصول على خدمة المعلومات حول الأدوية من خدمة سلامة الأمّهات Mothersafe

هل أستطيع مساعدة نفسي؟ (Can I help myself?)

نعم تستطيعين ذلك، احرصي على طلب المساعدة من مرضة صحة الطفل والعائلة أو طبيبك أو الممرضة الاجتماعية (إختصاصية صحة) إذا انتابتك أيّ من تلك المشاعر أو أحسست بأنك لا تتغلبين عليها.

كما يمكنك الاستعانة بالاقتراحات التالية:

- ♥ خذِي استراحة لتلبية حاجاتك الخاصة
- ♥ حاولي بناء صداقة مع نساء أو أمّهات فذلك قد يشكّل فرصة جيدة لتكوين صداقات مع البالغين وإنشاء شبكة دعم خاصة بك
- ♥ ناقشي أحاسيسك أو اكتبها وحاولي عدم الاحتفاظ بها في داخلك.
- ♥ أساليب الاسترخاء التي قد تشتمل على تمارين التنفس العميق
- ♥ احصلي على قسط وافر من الراحة والتمارين عندما تستطعي ذلك
- ♥ اتبعي نظاماً غذائياً متوازناً

لا تنسي أن شريكك قد يكون بحاجة للدعم أيضاً

مستوحاة من كتيب Tresillian Some Postnatal Feelings Handout (2006)

للحصول على مزيد من المعلومات راجعي الصفحة الأخيرة

منع الحمل (Contraception)

خلال الإرضاع من الثدي تمنع الهرمونات التي تفرز خلال عملية الإرضاع من الثدي، إنتاج الهرمونات المسؤولة عن الإباضة. فلهذا، كلما رضع طفالك أكثر كلما قل احتمال الإباضة. إذا كنت ملتزمة بالإرضاع من الثدي فقط (أي أئك ترضعين طفلك من ١ إلى ١٢ مرة خلال ٤٤ ساعة خلال الليل والنهار ولا تطعمينه أي طعام صلب أو سائل) ولم تخضي (بغض النظر عن النزيف الذي يحدث خلال الأسبوع الثمانية الأولى بعد الولادة) فمن المستبعد أن تحملي خلال الأشهر السّتة الأولى.

إلا أنه من المهم أن تناقشي خيارات منع الحمل مع طبيبك أو مرضة الصحة النسائية أو مركز تنظيم الأسرة في نيو ساوث ويلز (ragعي الصفحة الأخيرة).

الاعتناء بطفلك (TAKING CARE OF YOUR BABY)

الاستحمام / التدليك (Massage/Bathing)

يتعافى الأطفال من الولادة خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى من حياتهم. لذا قد يكون من المكملة الانتظار حتى اليوم التالي قبل تحميم طفلك. وسيتم ارشادك حول كيفية تحميمه. لا توجد طريقة محددة للقيام بذلك لأنّ أهم ما في الأمر هو الحفاظ على جسم طفلك دافئاً وأمناً وأن يكون الماء دافئاً وليس ساخناً وتتراوح حرارتها ما بين ٣٧ - ٤٠ درجة مئوية. واحرصي على أن تحممي الطفل في مكان خال من التيارات الهوائية. وينبغي أن يكون حوض الاستحمام، على ارتفاع مريح كي لا تضطري إلى الانحناء. وقد ترغبين بتدليك طفلك بعد الانتهاء من تحميمه.

الاعتناء بالحبل السري لطفلك (Caring for your babys cord)

لا تحتاج منطقة الحبل السري والحبل السري نفسه سوى إلى التنظيف في وقت الاستحمام يومياً بماء نظيف فقط وجفيفهما بعد ذلك، ويتحول الجزء المتبقى من الحبل السري إلى جزء صلب وأسود اللون ويضمحل. كما قد يصبح لزجاً وينزف قليلاً لأنّه ينفصل عن الجلد المحيط به. يقع عادةً الجزء المتبقى من الحبل السري بعد ٥ إلى ١٠ أيام من الولادة. نرجو منك أن تطلع طبيبك إذا أصبح هذا الجزء المتبقى أحمر اللون و/أو ذو رائحة كريهة.

إياك أن تهزي طفلك (Never Shake your baby)

يتسبب هز الطفل بقوة بارتجاج رأسه إلى الخلف والأمام. وقد ينتج عن ذلك حدوث نزيف في دماغه مؤدياً إلى تضرر الدماغ واحتمال الموت. إذا شعرت بالاضطراب أو الغضب أو الإحباط بسبب طفلك، تأكّди من وضعه في مكان آمن (مثل سرير الأطفال) وخذلي قسطاً من الراحة وامشي بعيداً وخصوصي وقتاً للاهتمام بنفسك. تذكري دائماً **عدم هز طفلك بقوّة على الإطلاق**.

إذا وجدت نفسك تقومين بذلك مراراً، نرجو منك الحصول على بعض المساعدة على سبيل المثال من قبل ممرضة صحة الطفل والعائلة (راجع الصفة الأخيرة).

الماصّة المطاطية / اللهاية (Dummies/Pacifiers)

لا ينصح باستخدام المصاصة المطاطية أو اللهاية أثناء تعلّم طفلك الرضاعة. لأنّ مصّ اللهاية من شأنه أن يرضي جوع الطفل وقد يفرق في النوم وتضيع عليه فرصة الرضاعة من الثدي. فضلاً عن ذلك، يكون الأطفال خلال الأيام القليلة الأولى في طور تعلم الرضاعة من الثدي والإمساك به ونظراً لاختلاف شكل اللهاية وملمسها عن الثدي، فقد يجعل مصّها عملية تعرق الرضاعة من الثدي ويجعلها تأخذ وقتاً أطول من العادة.

إذا كنت ترغبين باستعمال اللهاية، الرجاء أن تؤخّري ذلك على الأقلّ خلال الأسبوعين الثلاثة الأولى مما يتاح لطفلك الوقت لتعلم الرضاعة من الثدي بشكلٍ جيدٍ.

متلازمة الموت الفجائي للرضيع- النوم الآمن (Sudden Infant Death Syndrome (SIDS))

للحد من خطر الإصابة بمتلازمة الموت الفجائي للرضيع، احرصي على أن:

- ينام طفلك **معك في الغرفة** على الأقل خلال السنة إلى الإثني عشر شهراً الأولى.
- ينام طفلك على ظهره
- يكون الطفل بعيداً عن التدخين أثناء فترة حمله به وبعد ولادته أيضاً
- يبقى وجه طفلك مكشوفاً خلال نومه (أي لا تغطي وجهه باللحاف)

المشاركة في النوم (Co sleeping)

يزيد التدخين من خطر موت الطفل السري (متلازمة الموت الفجائي للرضيع). لا ينبغي أن تناامي مع طفلك إذا كنت أنت مدخنة (أو أي شخص آخر يشاركك السرير) حتى لو لم تدخن في السرير.

يشكّل النوم مع طفلك خطورة إذا كنت بجدين صعوبة (أنت أو شخص آخر يشاركك السرير) في الاستجابة للطفل. ومثال على ذلك، إذا كنت قد:

- ♥ تناولت الكحول
 - ♥ أخذت أي مخدر (قانوني أو منوع) من شأنه أن يزيد من نعاسك
 - ♥ نمت في سرير مائي أو على الأريكة
- لا تشجّع النساء ذوات الوزن الزائد على النوم مع أطفالهن.

إقرأي كتيّب "النوم الآمن" "Safe Sleeping" من إعداد "SIDS and Kids". كما يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.sidsandkids.org

تحصين الطفل (Immunisation)

يبدأ تحصين الطفل بتلقيحه في المستشفى ضد التهاب الكبد الوبائي ب. من شأن هذا اللقاح أن يحمي طفلك ضد فيروس قد يسبب له مرضًا خطيراً مزمناً في الكبد الذي يُعرف بالتهاب الكبد الوبائي ب. للحصول على برنامج تحصين طفلك، إقرئي الكتاب الأزرق الخاص بطفلك وعنوانه "سجلّي الصّحي الأول".

للحصول على مزيد من المعلومات، زوري الموقع الإلكتروني لبرنامج تحصين أستراليا www.immunise.health.gov.au وهو التالي: the Immunise Australia Program

السعال الديكي- تشجّع كافة الأهالي وغيرهم من المعنيين بشكل وثيق في رعاية طفلك أن يتلقّحوا مجدداً ضد السعال الديكي. إذ أنّ تعرّض المواليد الجدد لهذا الداء قبل التلقيح من شأنه أن يصيبهم بالإعياء الشديد. يعطّي هذا اللقاح مجاناً للأهل أو المعنيين بشكل وثيق في رعاية طفلك كما أنه لا يحمل أي خطورة خاتم الإرضاع من الثدي.

مقدّس السيارة الخاص بالطفل (Car Restraints)

عند اصطحاب طفلك في السيارة، عليك وضعه في مقعد السيارة المخصص للأطفال والمثبت بشكل صحيح. وتأكد من وضع حزام الأمان على ملابس طفالك مع مد البطانية فوق حزام الأمان المثبت بإحكام. فهذه هي الطريقة الأكثر أماناً لتضعي فيها طفالك أثناء اصطحابه في السيارة.

للحصول على مزيد من المعلومات، زوري الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والسير Roads and Traffic Authority التالى: www.rta.nsw.gov.au أو اتصل على الرقم: 132213 أو

زوري الموقع الإلكتروني لمستشفى ويستميد للأطفال وهو التالى: www.chw.edu.au/ أو اتصل على الرقم: 9845 0000 (02) parents/factsheets

ما تحتاجينه من دعم لدى عودتك إلى المنزل برفقة طفالك (Support when you take your baby home)

الحصول على المساعدة (Getting Help)

١. يتم إحالة **كاففة النساء وأطفالهن** إلى مرضية صحة الطفل والعائلة.
إذا لم يتم الاتصال بك من الخدمة المحلية أو كنت بحاجة للمساعدة الطارئة نرجو منك الاتصال على الأرقام التالية:

خدمة الإحالات المركزية (CENTRAL REFERRAL SERVICE)

1800 222 608

Penrith, St Mary's, St Clair, Cranebrook, Springwood, Lawson, Blue Mountains, Lithgow, Auburn, Merrylands, Parramatta, The Hills, Blacktown, Doonside, Mt Druitt

4560 5714

Hawkesbury Community Health Centre

٢. يجب أن يراجع **كاففة الأطفال الطبيب المحلي أو طبيب الأطفال** خلال أسبوع إلى أربعة أسابيع من الولادة للتأكد من أن التغيرات التي حدثت بعد الولادة تستمرة بشكل جيد.
٣. نشجع **كاففة النساء** على زيارة الطبيب المحلي أو الطبيب النسائي بعد ستة إلى ثمانية أسابيع من الولادة لتقديم عملية شفائك بعد الحمل والولادة.
٤. وسائل دعم أخرى - أنظري إلى غلاف كتاب "سجل الصحي الأول" الخاص بطفلك

مصادر أخرى

للحصول على مساعدة أو معلومات عامة حول الأمومة أو الأبوة والإرضاع من الثدي ومسائل صحية أخرى، ننصحك بالإطلاع على المراجع التالية:

أ. تواجد المراجع المتعددة الثقافات على الموقع الإلكتروني التالي:

<http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/languages.asp>

ب. دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز وهو السجل الصحي الأول لطفلك ويشتمل على خدمات دعم أخرى مفيدة.

ج. NSW Health Pregnancy, Birth and Baby Helpline 1800 88 243 خط المساعدة الصحية في نيوساوث ويلز بشأن الحمل والولادة والأطفال

د. Mothersafe - خدمة الأدوية أثناء الحمل والرضاعة

سيدني منطقة العاصمة 02 9382 6539

منطقة خارج العاصمة 1800 647848

ورقة المعلومات الخاصة بالإرضاع من الثدي Mothersafe

<http://www.sesiahs.health.nsw.gov.au/Mothersafe/Factsheets.asp>

هـ جمعية الإرضاع من الثدي الأسترالية 1800 686 2 686

<http://www.breastfeeding.asn.au/>

وـ الكحول والإرضاع من الثدي *Alcohol and Breastfeeding*: دليل للأمهات. يتوفّر الكتاب على الموقع التالي:

[http://www.alcohol.gov.au/internet/alcohol/publishing.nsf/Content/D068D37123F7837BCA2576730076F850/\\$File/breastbr.pdf](http://www.alcohol.gov.au/internet/alcohol/publishing.nsf/Content/D068D37123F7837BCA2576730076F850/$File/breastbr.pdf)

http://www.lrc.asn.au/ABA_Alcohol_BF.pdf

زـ معلومات حول اضطراب المزاج قبل الولادة واكتئاب ما بعد الولادة وغيرها من المشاكل الصحية النفسية

الموقع الإلكتروني الخاص بـ [Beyond Blues](http://www.beyondblue.org.au)

الموقع الإلكتروني الخاص بـ [Beat Baby Blues](http://www.beatbabyblues.com.au)

<http://www.blackdoginstitute.org.au> Black Dog Institute

مقدمو الرعاية هم الذين ينحوون الآخرين الرعاية والمساعدة مجاناً.
وقد يكونون من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الجيران.
من الضروري إعلام الفريق الطبي عن الأشخاص الذين يرعونك.

تتوفر لدينا خدمة **الترجمة الفورية** المجانية والسرية على مدى 7 أيام في الأسبوع وعلى مدار الساعة.
لا تتردد في أن تطلبني من فريق عملنا تأمين مترجم فوري لك.
كما تتوفر لدينا خدمة للصم والبكم AUSLAN.

يمنع التدخين في جميع دوائر نيو ساوث ويلز الصحية
سواء في الباحثات الخارجية أو داخل المباني.
لساعدتك في الإقلاع عن التدخين الاتصال بـ **Quitline™** على الرقم 131 848



CBAHI

المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
Saudi Central Board for Accreditation
of Healthcare Institutions




COLLEGE of AMERICAN PATHOLOGISTS



أوكس
care
مستشفيات رعاية
Care Hospitals

للاستفسار أو لحجز الخدمة

📞 011 4378888
📞 050 1287887



0114378888

🐦 📱 hospitals_care